

表 3558 PTH値(pg/mL) 性別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,138	1,415	1,277	2,100	1,857	1,522	1,045	28	835	569	403	417	184	117	110	138	13,155	389	13,544	107.37	108.26
(%)	(8.7)	(10.8)	(9.7)	(16.0)	(14.1)	(11.6)	(7.9)	(0.2)	(6.3)	(4.3)	(3.1)	(3.2)	(1.4)	(0.9)	(0.8)	(1.0)	(100.0)				
女性	756	916	766	1,053	891	776	494	20	428	306	225	257	100	62	92	109	7,251	268	7,519	109.15	123.78
(%)	(10.4)	(12.6)	(10.6)	(14.5)	(12.3)	(10.7)	(6.8)	(0.3)	(5.9)	(4.2)	(3.1)	(3.5)	(1.4)	(0.9)	(1.3)	(1.5)	(100.0)				
合計	1,894	2,331	2,043	3,153	2,748	2,298	1,539	48	1,263	875	628	674	284	179	202	247	20,406	657	21,063	108.01	114.01
(%)	(9.3)	(11.4)	(10.0)	(15.5)	(13.5)	(11.3)	(7.5)	(0.2)	(6.2)	(4.3)	(3.1)	(3.3)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.2)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	1,894	2,331	2,043	3,153	2,748	2,298	1,539	48	1,263	875	628	674	284	179	202	247	20,406	657	21,063	108.01	114.01
(%)	(9.3)	(11.4)	(10.0)	(15.5)	(13.5)	(11.3)	(7.5)	(0.2)	(6.2)	(4.3)	(3.1)	(3.3)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.2)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査