

表 3571 PTH値(pg/mL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	910	1,119	1,021	1,656	1,465	1,187	817	21	617	428	306	317	133	86	82	95	10,260	263	10,523	104.71	101.00
(%)	(8.9)	(10.9)	(10.0)	(16.1)	(14.3)	(11.6)	(8.0)	(0.2)	(6.0)	(4.2)	(3.0)	(3.1)	(1.3)	(0.8)	(0.8)	(0.9)	(100.0)				
女性	589	729	592	803	683	600	370	16	317	238	166	209	72	49	70	71	5,574	175	5,749	107.51	122.96
(%)	(10.6)	(13.1)	(10.6)	(14.4)	(12.3)	(10.8)	(6.6)	(0.3)	(5.7)	(4.3)	(3.0)	(3.7)	(1.3)	(0.9)	(1.3)	(1.3)	(100.0)				
合計	1,499	1,848	1,613	2,459	2,148	1,787	1,187	37	934	666	472	526	205	135	152	166	15,834	438	16,272	105.70	109.24
(%)	(9.5)	(11.7)	(10.2)	(15.5)	(13.6)	(11.3)	(7.5)	(0.2)	(5.9)	(4.2)	(3.0)	(3.3)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(1.0)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	1,499	1,848	1,613	2,459	2,148	1,787	1,187	37	934	666	472	526	205	135	152	166	15,834	438	16,272	105.70	109.24
(%)	(9.5)	(11.7)	(10.2)	(15.5)	(13.6)	(11.3)	(7.5)	(0.2)	(5.9)	(4.2)	(3.0)	(3.3)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(1.0)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査