

表 3584 PTH値(pg/mL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	143	183	163	289	265	223	160	4	136	92	60	57	27	18	12	22	1,854	13	1,867	110.91	101.37
(%)	(7.7)	(9.9)	(8.8)	(15.6)	(14.3)	(12.0)	(8.6)	(0.2)	(7.3)	(5.0)	(3.2)	(3.1)	(1.5)	(1.0)	(0.6)	(1.2)	(100.0)				
女性	106	118	111	155	126	108	74		79	45	38	31	15	11	12	23	1,052	18	1,070	113.35	119.12
(%)	(10.1)	(11.2)	(10.6)	(14.7)	(12.0)	(10.3)	(7.0)		(7.5)	(4.3)	(3.6)	(2.9)	(1.4)	(1.0)	(1.1)	(2.2)	(100.0)				
合計	249	301	274	444	391	331	234	4	215	137	98	88	42	29	24	45	2,906	31	2,937	111.79	108.12
(%)	(8.6)	(10.4)	(9.4)	(15.3)	(13.5)	(11.4)	(8.1)	(0.1)	(7.4)	(4.7)	(3.4)	(3.0)	(1.4)	(1.0)	(0.8)	(1.5)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	249	301	274	444	391	331	234	4	215	137	98	88	42	29	24	45	2,906	31	2,937	111.79	108.12
(%)	(8.6)	(10.4)	(9.4)	(15.3)	(13.5)	(11.4)	(8.1)	(0.1)	(7.4)	(4.7)	(3.4)	(3.0)	(1.4)	(1.0)	(0.8)	(1.5)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査