

表 3597 PTH値(pg/mL) 性別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	24	26	34	55	42	45	29		32	21	18	18	13	6	9	7	379	88	467	138.11	134.86
(%)	(6.3)	(6.9)	(9.0)	(14.5)	(11.1)	(11.9)	(7.7)		(8.4)	(5.5)	(4.7)	(4.7)	(3.4)	(1.6)	(2.4)	(1.8)	(100.0)				
女性	16	19	21	22	27	26	16	1	11	13	9	5	6	2	2	4	200	52	252	122.03	117.95
(%)	(8.0)	(9.5)	(10.5)	(11.0)	(13.5)	(13.0)	(8.0)	(0.5)	(5.5)	(6.5)	(4.5)	(2.5)	(3.0)	(1.0)	(1.0)	(2.0)	(100.0)				
合計	40	45	55	77	69	71	45	1	43	34	27	23	19	8	11	11	579	140	719	132.56	129.39
(%)	(6.9)	(7.8)	(9.5)	(13.3)	(11.9)	(12.3)	(7.8)	(0.2)	(7.4)	(5.9)	(4.7)	(4.0)	(3.3)	(1.4)	(1.9)	(1.9)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	40	45	55	77	69	71	45	1	43	34	27	23	19	8	11	11	579	140	719	132.56	129.39
(%)	(6.9)	(7.8)	(9.5)	(13.3)	(11.9)	(12.3)	(7.8)	(0.2)	(7.4)	(5.9)	(4.7)	(4.0)	(3.3)	(1.4)	(1.9)	(1.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査