

表 3607 PTH値(pg/mL) 収縮期血圧(mmHg)別(腹膜透析患者) PTH測定法:whole-PTH

収縮期血圧	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)																					
60～ (%)	1 (50.0)		1 (50.0)														2 (100.0)		2	27.00	21.21
80～ (%)		1 (10.0)	2 (20.0)		2 (20.0)	3 (30.0)				1 (10.0)					1 (10.0)		10 (100.0)		10	122.00	114.32
100～ (%)	4 (5.7)	6 (8.6)	5 (7.1)	13 (18.6)	8 (11.4)	9 (12.9)	4 (5.7)		5 (7.1)	5 (7.1)	1 (1.4)	7 (10.0)	2 (2.9)			1 (1.4)	70 (100.0)	4	74	128.73	137.38
120～ (%)	7 (4.8)	12 (8.3)	16 (11.0)	20 (13.8)	20 (13.8)	13 (9.0)	8 (5.5)	1 (0.7)	8 (5.5)	9 (6.2)	10 (6.9)	6 (4.1)	4 (2.8)	2 (1.4)	7 (4.8)	2 (1.4)	145 (100.0)	6	151	138.67	123.22
140～ (%)	10 (5.2)	17 (8.8)	19 (9.8)	25 (13.0)	22 (11.4)	26 (13.5)	21 (10.9)		13 (6.7)	6 (3.1)	10 (5.2)	8 (4.1)	5 (2.6)	5 (2.6)	1 (0.5)	5 (2.6)	193 (100.0)	2	195	134.58	139.68
160～ (%)	11 (12.0)	5 (5.4)	10 (10.9)	7 (7.6)	11 (12.0)	11 (12.0)	6 (6.5)		9 (9.8)	7 (7.6)	4 (4.3)	1 (1.1)	7 (7.6)	1 (1.1)		2 (2.2)	92 (100.0)	3	95	128.72	113.73
180～ (%)	3 (9.7)	3 (9.7)		5 (16.1)	1 (3.2)	4 (12.9)	3 (9.7)		5 (16.1)	2 (6.5)	2 (6.5)	1 (3.2)				1 (3.2)	31 (100.0)	1	32	147.87	167.56
200～ (%)					2 (50.0)		1 (25.0)		1 (25.0)								4 (100.0)		4	117.00	37.35
220～ (%)										1 (100.0)							1 (100.0)		1	185.00	
合計 (%)	36 (6.6)	44 (8.0)	53 (9.7)	70 (12.8)	66 (12.0)	66 (12.0)	43 (7.8)	1 (0.2)	41 (7.5)	31 (5.7)	27 (4.9)	23 (4.2)	18 (3.3)	8 (1.5)	10 (1.8)	11 (2.0)	548 (100.0)	16	564	134.02	131.22
記載なし (%)	4 (12.9)	1 (3.2)	2 (6.5)	7 (22.6)	3 (9.7)	5 (16.1)	2 (6.5)		2 (6.5)	3 (9.7)			1 (3.2)		1 (3.2)		31 (100.0)	124	155	106.61	88.89
総計 (%)	40 (6.9)	45 (7.8)	55 (9.5)	77 (13.3)	69 (11.9)	71 (12.3)	45 (7.8)	1 (0.2)	43 (7.4)	34 (5.9)	27 (4.7)	23 (4.0)	19 (3.3)	8 (1.4)	11 (1.9)	11 (1.9)	579 (100.0)	140	719	132.56	129.39
平均	148.00	141.45	139.34	141.34	141.38	142.82	147.88	134.00	149.76	144.13	145.19	134.78	148.06	144.75	131.60	147.18	143.19	137.13	143.02		
標準偏差	29.35	21.73	23.29	21.04	23.25	24.29	21.16		22.45	28.53	19.49	22.50	19.24	13.60	24.58	22.31	23.18	23.63	23.19		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査