

表 3610 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	269 (0.1)	380 (0.2)	1,011 (0.4)	3,822 (1.7)	12,410 (5.4)	38,710 (16.8)	78,261 (34.0)	64,036 (27.8)	23,322 (10.1)	5,790 (2.5)	2,014 (0.9)	230,025 (100.0)	25,616	255,641	10.68	1.28
血液透析濾過 （％）	26 (0.1)	33 (0.1)	118 (0.3)	466 (1.2)	1,691 (4.3)	6,013 (15.1)	13,301 (33.4)	11,871 (29.8)	4,497 (11.3)	1,213 (3.0)	549 (1.4)	39,778 (100.0)	3,505	43,283	10.84	1.27
血液濾過 （％）				2 (2.2)	5 (5.5)	19 (20.9)	24 (26.4)	27 (29.7)	11 (12.1)	2 (2.2)	1 (1.1)	91 (100.0)	1	92	10.72	1.27
血液吸着透析 （％）		2 (0.1)	3 (0.2)	20 (1.3)	93 (6.0)	296 (19.0)	542 (34.8)	413 (26.5)	149 (9.6)	33 (2.1)	7 (0.4)	1,558 (100.0)	72	1,630	10.62	1.19
在宅血液透析 （％）	1 (0.3)			1 (0.3)	11 (2.8)	48 (12.3)	78 (19.9)	117 (29.9)	79 (20.2)	33 (8.4)	23 (5.9)	391 (100.0)	130	521	11.45	1.51
腹膜透析 （％）	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
合計 （％）	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,989 (16.6)	93,912 (33.8)	78,173 (28.1)	28,854 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,790 (100.0)	32,318	310,108	10.71	1.28
記載なし （％）																
総計 （％）	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,989 (16.6)	93,912 (33.8)	78,173 (28.1)	28,854 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,790 (100.0)	32,318	310,108	10.71	1.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査