

表 3613 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（透析患者全体）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	183	269	696	2,661	8,630	27,407	58,876	51,639	19,896	5,291	2,068	177,616	20,525	198,141	10.78	1.30
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.5)	(4.9)	(15.4)	(33.1)	(29.1)	(11.2)	(3.0)	(1.2)	(100.0)				
女性	120	160	464	1,774	5,924	18,582	35,036	26,534	8,958	2,017	605	100,174	11,793	111,967	10.59	1.25
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(1.8)	(5.9)	(18.5)	(35.0)	(26.5)	(8.9)	(2.0)	(0.6)	(100.0)				
合計	303	429	1,160	4,435	14,554	45,989	93,912	78,173	28,854	7,308	2,673	277,790	32,318	310,108	10.71	1.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.6)	(5.2)	(16.6)	(33.8)	(28.1)	(10.4)	(2.6)	(1.0)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	303	429	1,160	4,435	14,554	45,989	93,912	78,173	28,854	7,308	2,673	277,790	32,318	310,108	10.71	1.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.6)	(5.2)	(16.6)	(33.8)	(28.1)	(10.4)	(2.6)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査