

表 3614 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				2 (2.8)	6 (8.3)	12 (16.7)	27 (37.5)	17 (23.6)	5 (6.9)	1 (1.4)	2 (2.8)	72 (100.0)	45	117	10.52	1.35
15歳～ (%)	1 (0.1)			14 (1.5)	53 (5.8)	119 (13.1)	259 (28.5)	284 (31.3)	129 (14.2)	35 (3.9)	14 (1.5)	908 (100.0)	129	1,037	10.92	1.31
30歳～ (%)	7 (0.1)	13 (0.1)	43 (0.3)	160 (1.2)	506 (3.9)	1,751 (13.6)	4,004 (31.0)	4,033 (31.2)	1,670 (12.9)	506 (3.9)	214 (1.7)	12,907 (100.0)	1,478	14,385	10.94	1.30
45歳～ (%)	43 (0.1)	50 (0.1)	155 (0.3)	604 (1.2)	1,923 (3.8)	6,953 (13.7)	16,483 (32.5)	15,514 (30.6)	6,402 (12.6)	1,858 (3.7)	792 (1.6)	50,777 (100.0)	5,791	56,568	10.91	1.29
60歳～ (%)	136 (0.1)	207 (0.2)	527 (0.4)	1,850 (1.5)	6,358 (5.0)	20,977 (16.5)	43,467 (34.1)	36,157 (28.4)	13,245 (10.4)	3,310 (2.6)	1,184 (0.9)	127,418 (100.0)	14,560	141,978	10.72	1.27
75歳～ (%)	108 (0.1)	147 (0.2)	410 (0.5)	1,687 (2.1)	5,370 (6.6)	15,218 (18.7)	28,195 (34.7)	21,059 (25.9)	7,080 (8.7)	1,528 (1.9)	453 (0.6)	81,255 (100.0)	9,742	90,997	10.54	1.27
90歳～ (%)	8 (0.2)	12 (0.3)	25 (0.6)	118 (2.7)	338 (7.6)	954 (21.5)	1,474 (33.2)	1,102 (24.8)	322 (7.3)	70 (1.6)	14 (0.3)	4,437 (100.0)	568	5,005	10.41	1.28
合計 (%)	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,984 (16.6)	93,909 (33.8)	78,166 (28.1)	28,853 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,774 (100.0)	32,313	310,087	10.71	1.28
不明 (%)						5 (31.3)	3 (18.8)	7 (43.8)	1 (6.3)			16 (100.0)	5	21	10.68	0.92
記載なし (%)																
総計 (%)	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,989 (16.6)	93,912 (33.8)	78,173 (28.1)	28,854 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,790 (100.0)	32,318	310,108	10.71	1.28
平均	70.11	70.12	69.98	70.18	70.02	69.01	67.88	66.69	65.66	64.21	62.50	67.52	67.73	67.54		
標準偏差	11.92	11.45	11.91	12.54	12.31	12.19	12.27	12.52	12.60	12.71	12.65	12.46	12.80	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査