

表 3622 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮 期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1 (2.6)	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (7.7)	2 (5.1)	4 (10.3)	15 (38.5)	9 (23.1)	3 (7.7)			39 (100.0)	1	40	10.00	1.79
60～ (%)	1 (0.2)		5 (1.2)	19 (4.5)	48 (11.4)	69 (16.4)	108 (25.7)	99 (23.6)	47 (11.2)	13 (3.1)	11 (2.6)	420 (100.0)	13	433	10.55	1.64
80～ (%)	1 (0.0)	9 (0.3)	36 (1.1)	109 (3.3)	251 (7.7)	582 (17.7)	933 (28.4)	831 (25.3)	348 (10.6)	120 (3.7)	61 (1.9)	3,281 (100.0)	57	3,338	10.61	1.52
100～ (%)	27 (0.2)	30 (0.2)	125 (0.7)	397 (2.3)	1,152 (6.6)	2,927 (16.9)	5,418 (31.2)	4,694 (27.0)	1,906 (11.0)	473 (2.7)	211 (1.2)	17,360 (100.0)	247	17,607	10.66	1.40
120～ (%)	69 (0.1)	90 (0.2)	200 (0.4)	884 (1.7)	2,807 (5.3)	8,441 (16.1)	17,731 (33.7)	15,021 (28.6)	5,408 (10.3)	1,423 (2.7)	506 (1.0)	52,580 (100.0)	691	53,271	10.72	1.29
140～ (%)	90 (0.1)	129 (0.2)	306 (0.4)	1,147 (1.4)	3,838 (4.8)	12,648 (15.8)	27,756 (34.7)	23,002 (28.8)	8,257 (10.3)	2,018 (2.5)	699 (0.9)	79,890 (100.0)	932	80,822	10.73	1.26
160～ (%)	52 (0.1)	71 (0.1)	192 (0.3)	796 (1.4)	2,738 (4.8)	9,555 (16.6)	19,835 (34.5)	16,409 (28.5)	5,991 (10.4)	1,433 (2.5)	495 (0.9)	57,567 (100.0)	628	58,195	10.73	1.24
180～ (%)	11 (0.1)	33 (0.2)	78 (0.4)	296 (1.3)	1,094 (5.0)	3,663 (16.7)	7,491 (34.1)	6,224 (28.3)	2,284 (10.4)	586 (2.7)	219 (1.0)	21,979 (100.0)	245	22,224	10.73	1.26
200～ (%)	10 (0.2)	7 (0.1)	17 (0.3)	73 (1.3)	275 (5.0)	898 (16.4)	1,832 (33.4)	1,541 (28.1)	595 (10.9)	178 (3.2)	55 (1.0)	5,481 (100.0)	65	5,546	10.75	1.29
220～ (%)			7 (0.6)	13 (1.1)	57 (5.0)	200 (17.5)	364 (31.8)	307 (26.8)	142 (12.4)	40 (3.5)	16 (1.4)	1,146 (100.0)	14	1,160	10.79	1.32
合計 (%)	262 (0.1)	370 (0.2)	967 (0.4)	3,737 (1.6)	12,262 (5.1)	38,987 (16.3)	81,483 (34.0)	68,137 (28.4)	24,981 (10.4)	6,284 (2.6)	2,273 (0.9)	239,743 (100.0)	2,893	242,636	10.72	1.28
記載なし (%)	41 (0.1)	59 (0.2)	193 (0.5)	698 (1.8)	2,292 (6.0)	7,002 (18.4)	12,429 (32.7)	10,036 (26.4)	3,873 (10.2)	1,024 (2.7)	400 (1.1)	38,047 (100.0)	29,425	67,472	10.64	1.33
総計 (%)	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,989 (16.6)	93,912 (33.8)	78,173 (28.1)	28,854 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,790 (100.0)	32,318	310,108	10.71	1.28
平均	147.05	147.83	145.87	146.73	149.02	151.21	151.63	151.38	151.16	150.85	149.13	151.15	149.04	151.13		
標準偏差	24.65	24.45	27.50	26.01	25.52	24.48	23.72	23.87	24.57	25.32	26.63	24.21	25.17	24.23		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査