

表 3626 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (9.1)	2 (18.2)	4 (36.4)	2 (18.2)	2 (18.2)			11 (100.0)	1	12	10.49	1.17
15歳～ (%)	1 (0.2)			7 (1.1)	35 (5.6)	80 (12.8)	179 (28.5)	198 (31.6)	91 (14.5)	26 (4.1)	10 (1.6)	627 (100.0)	30	657	10.96	1.29
30歳～ (%)	5 (0.1)	9 (0.1)	36 (0.4)	119 (1.3)	399 (4.2)	1,305 (13.8)	2,989 (31.6)	2,900 (30.6)	1,188 (12.6)	370 (3.9)	143 (1.5)	9,463 (100.0)	339	9,802	10.90	1.30
45歳～ (%)	38 (0.1)	37 (0.1)	120 (0.3)	451 (1.2)	1,454 (3.8)	5,324 (13.9)	12,498 (32.7)	11,642 (30.5)	4,749 (12.4)	1,311 (3.4)	558 (1.5)	38,182 (100.0)	1,403	39,585	10.89	1.28
60歳～ (%)	113 (0.1)	177 (0.2)	425 (0.4)	1,500 (1.5)	5,038 (5.0)	16,733 (16.6)	34,558 (34.4)	28,374 (28.2)	10,280 (10.2)	2,546 (2.5)	861 (0.9)	100,605 (100.0)	3,773	104,378	10.71	1.27
75歳～ (%)	96 (0.1)	129 (0.2)	341 (0.5)	1,408 (2.1)	4,522 (6.7)	12,767 (18.8)	23,727 (35.0)	17,447 (25.7)	5,799 (8.6)	1,226 (1.8)	353 (0.5)	67,815 (100.0)	2,817	70,632	10.53	1.27
90歳～ (%)	8 (0.2)	10 (0.3)	20 (0.5)	93 (2.5)	277 (7.4)	823 (22.1)	1,259 (33.8)	912 (24.5)	260 (7.0)	58 (1.6)	8 (0.2)	3,728 (100.0)	161	3,889	10.39	1.26
合計 (%)	261 (0.1)	362 (0.2)	942 (0.4)	3,578 (1.6)	11,726 (5.3)	37,034 (16.8)	75,214 (34.1)	61,475 (27.9)	22,369 (10.1)	5,537 (2.5)	1,933 (0.9)	220,431 (100.0)	8,524	228,955	10.69	1.28
不明 (%)						4 (33.3)	3 (25.0)	4 (33.3)	1 (8.3)			12 (100.0)	4	16	10.63	0.98
記載なし (%)																
総計 (%)	261 (0.1)	362 (0.2)	942 (0.4)	3,578 (1.6)	11,726 (5.3)	37,038 (16.8)	75,217 (34.1)	61,479 (27.9)	22,370 (10.1)	5,537 (2.5)	1,933 (0.9)	220,443 (100.0)	8,528	228,971	10.69	1.28
平均	70.47	70.60	70.18	70.66	70.49	69.51	68.39	67.24	66.20	64.79	63.01	68.06	68.67	68.08		
標準偏差	11.92	11.13	11.94	12.14	12.12	12.03	12.13	12.39	12.50	12.68	12.50	12.32	12.41	12.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査