

表 3634 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前収縮 期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	3 (8.8)	2 (5.9)	4 (11.8)	11 (32.4)	8 (23.5)	3 (8.8)			34 (100.0)	1	35	9.89	1.90
60～ (%)	1 (0.4)		3 (1.1)	10 (3.8)	31 (11.8)	41 (15.6)	72 (27.5)	56 (21.4)	31 (11.8)	8 (3.1)	9 (3.4)	262 (100.0)	9	271	10.61	1.70
80～ (%)	1 (0.0)	7 (0.3)	24 (1.0)	81 (3.5)	188 (8.0)	408 (17.4)	680 (29.0)	602 (25.7)	229 (9.8)	80 (3.4)	43 (1.8)	2,343 (100.0)	34	2,377	10.58	1.51
100～ (%)	25 (0.2)	26 (0.2)	96 (0.7)	305 (2.4)	897 (6.9)	2,241 (17.3)	4,080 (31.5)	3,469 (26.8)	1,343 (10.4)	340 (2.6)	142 (1.1)	12,964 (100.0)	191	13,155	10.62	1.40
120～ (%)	58 (0.1)	62 (0.2)	158 (0.4)	713 (1.7)	2,232 (5.4)	6,648 (16.2)	14,092 (34.3)	11,619 (28.3)	4,084 (9.9)	1,038 (2.5)	348 (0.8)	41,052 (100.0)	524	41,576	10.69	1.27
140～ (%)	79 (0.1)	118 (0.2)	253 (0.4)	944 (1.5)	3,080 (4.8)	10,193 (16.0)	22,165 (34.9)	18,145 (28.6)	6,466 (10.2)	1,552 (2.4)	518 (0.8)	63,513 (100.0)	690	64,203	10.71	1.26
160～ (%)	41 (0.1)	65 (0.1)	158 (0.3)	657 (1.4)	2,268 (4.9)	7,764 (16.8)	16,088 (34.7)	13,112 (28.3)	4,705 (10.2)	1,117 (2.4)	369 (0.8)	46,344 (100.0)	499	46,843	10.71	1.24
180～ (%)	10 (0.1)	26 (0.1)	68 (0.4)	241 (1.4)	897 (5.0)	3,026 (17.0)	6,101 (34.3)	4,981 (28.0)	1,836 (10.3)	457 (2.6)	164 (0.9)	17,807 (100.0)	195	18,002	10.72	1.26
200～ (%)	9 (0.2)	7 (0.2)	15 (0.3)	60 (1.3)	221 (5.0)	741 (16.6)	1,499 (33.6)	1,224 (27.4)	500 (11.2)	142 (3.2)	43 (1.0)	4,461 (100.0)	54	4,515	10.74	1.30
220～ (%)			5 (0.6)	12 (1.4)	43 (4.9)	147 (16.6)	284 (32.1)	244 (27.6)	109 (12.3)	31 (3.5)	10 (1.1)	885 (100.0)	9	894	10.78	1.29
合計 (%)	225 (0.1)	312 (0.2)	781 (0.4)	3,026 (1.6)	9,859 (5.2)	31,213 (16.5)	65,072 (34.3)	53,460 (28.2)	19,306 (10.2)	4,765 (2.5)	1,646 (0.9)	189,665 (100.0)	2,206	191,871	10.70	1.27
記載なし (%)	36 (0.1)	50 (0.2)	161 (0.5)	552 (1.8)	1,867 (6.1)	5,825 (18.9)	10,145 (33.0)	8,019 (26.1)	3,064 (10.0)	772 (2.5)	287 (0.9)	30,778 (100.0)	6,322	37,100	10.62	1.31
総計 (%)	261 (0.1)	362 (0.2)	942 (0.4)	3,578 (1.6)	11,726 (5.3)	37,038 (16.8)	75,217 (34.1)	61,479 (27.9)	22,370 (10.1)	5,537 (2.5)	1,933 (0.9)	220,443 (100.0)	8,528	228,971	10.69	1.28
平均	146.55	148.84	147.03	147.35	149.49	151.73	152.03	151.87	151.99	151.67	149.78	151.66	149.70	151.64		
標準偏差	25.22	24.40	26.91	25.76	25.29	24.22	23.55	23.67	24.32	25.08	26.62	24.00	25.04	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査