

表 3638 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)							2 (100.0)					2 (100.0)		2	10.45	0.21
15歳～ (%)				6 (3.9)	6 (3.9)	17 (11.0)	48 (31.2)	50 (32.5)	21 (13.6)	4 (2.6)	2 (1.3)	154 (100.0)	8	162	10.86	1.32
30歳～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	20 (0.8)	67 (2.8)	303 (12.4)	734 (30.1)	809 (33.2)	343 (14.1)	98 (4.0)	56 (2.3)	2,436 (100.0)	52	2,488	11.07	1.30
45歳～ (%)	4 (0.0)	7 (0.1)	20 (0.2)	81 (0.9)	275 (3.1)	1,092 (12.3)	2,878 (32.4)	2,800 (31.5)	1,170 (13.2)	398 (4.5)	171 (1.9)	8,896 (100.0)	277	9,173	11.02	1.27
60歳～ (%)	15 (0.1)	14 (0.1)	61 (0.3)	191 (1.0)	820 (4.4)	2,844 (15.4)	6,271 (34.0)	5,483 (29.7)	2,013 (10.9)	511 (2.8)	231 (1.3)	18,454 (100.0)	560	19,014	10.81	1.25
75歳～ (%)	5 (0.1)	8 (0.1)	27 (0.3)	140 (1.7)	443 (5.3)	1,522 (18.0)	2,917 (34.6)	2,339 (27.7)	805 (9.5)	169 (2.0)	59 (0.7)	8,434 (100.0)	320	8,754	10.66	1.24
90歳～ (%)		1 (0.3)	3 (0.9)	7 (2.1)	26 (7.7)	71 (21.0)	97 (28.7)	94 (27.8)	30 (8.9)	5 (1.5)	4 (1.2)	338 (100.0)	12	350	10.53	1.33
合計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,849 (15.1)	12,947 (33.4)	11,575 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,714 (100.0)	1,229	39,943	10.84	1.26
不明 (%)						1 (33.3)		2 (66.7)				3 (100.0)		3	10.63	0.81
記載なし (%)																
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	64.23	68.03	68.18	67.77	67.59	66.70	65.34	64.25	63.30	61.47	60.58	64.94	66.17	64.98		
標準偏差	11.38	12.84	11.26	13.28	12.06	12.14	12.22	12.38	12.48	12.12	12.34	12.37	12.49	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査