

表 3640 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

| 原疾患                  | 5未満         | 5～          | 6～           | 7～           | 8～             | 9～              | 10～              | 11～              | 12～             | 13～            | 14～          | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均    | 標準偏差 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------|--------|-------|------|
| 慢性糸球体腎炎<br>(%)       | 10<br>(0.1) | 8<br>(0.1)  | 44<br>(0.3)  | 161<br>(1.1) | 546<br>(3.7)   | 2,134<br>(14.5) | 4,919<br>(33.5)  | 4,495<br>(30.6)  | 1,739<br>(11.8) | 440<br>(3.0)   | 186<br>(1.3) | 14,682<br>(100.0) | 394   | 15,076 | 10.87 | 1.24 |
| 慢性腎盂腎炎<br>(%)        | 1<br>(0.2)  | 2<br>(0.5)  |              | 2<br>(0.5)   | 22<br>(5.4)    | 42<br>(10.3)    | 154<br>(37.7)    | 130<br>(31.8)    | 43<br>(10.5)    | 11<br>(2.7)    | 2<br>(0.5)   | 409<br>(100.0)    | 13    | 422    | 10.80 | 1.20 |
| 急速進行性糸球体腎炎<br>(%)    |             |             | 1<br>(0.4)   | 2<br>(0.7)   | 16<br>(5.8)    | 48<br>(17.4)    | 94<br>(34.1)     | 80<br>(29.0)     | 28<br>(10.1)    | 7<br>(2.5)     |              | 276<br>(100.0)    | 8     | 284    | 10.69 | 1.13 |
| 妊娠腎/妊娠中毒症<br>(%)     |             |             | 1<br>(0.3)   | 3<br>(0.9)   | 15<br>(4.3)    | 74<br>(21.0)    | 128<br>(36.4)    | 88<br>(25.0)     | 35<br>(9.9)     | 6<br>(1.7)     | 2<br>(0.6)   | 352<br>(100.0)    | 7     | 359    | 10.65 | 1.13 |
| その他の分類不能の腎炎<br>(%)   |             |             |              | 2<br>(1.0)   | 8<br>(4.2)     | 18<br>(9.4)     | 71<br>(37.0)     | 58<br>(30.2)     | 25<br>(13.0)    | 5<br>(2.6)     | 5<br>(2.6)   | 192<br>(100.0)    | 3     | 195    | 11.00 | 1.24 |
| 多発性嚢胞腎<br>(%)        |             | 2<br>(0.1)  | 3<br>(0.2)   | 9<br>(0.6)   | 37<br>(2.6)    | 201<br>(14.3)   | 444<br>(31.5)    | 433<br>(30.7)    | 191<br>(13.5)   | 64<br>(4.5)    | 26<br>(1.8)  | 1,410<br>(100.0)  | 54    | 1,464  | 11.02 | 1.28 |
| 腎硬化症<br>(%)          |             | 1<br>(0.0)  | 8<br>(0.3)   | 38<br>(1.4)  | 145<br>(5.2)   | 463<br>(16.5)   | 910<br>(32.5)    | 862<br>(30.8)    | 279<br>(10.0)   | 69<br>(2.5)    | 28<br>(1.0)  | 2,803<br>(100.0)  | 83    | 2,886  | 10.76 | 1.23 |
| 悪性高血圧<br>(%)         |             | 2<br>(0.7)  |              | 5<br>(1.7)   | 7<br>(2.3)     | 49<br>(16.3)    | 92<br>(30.7)     | 98<br>(32.7)     | 35<br>(11.7)    | 8<br>(2.7)     | 4<br>(1.3)   | 300<br>(100.0)    | 12    | 312    | 10.88 | 1.25 |
| 糖尿病性腎症<br>(%)        | 10<br>(0.1) | 12<br>(0.1) | 35<br>(0.3)  | 153<br>(1.2) | 579<br>(4.5)   | 1,994<br>(15.6) | 4,251<br>(33.3)  | 3,664<br>(28.7)  | 1,419<br>(11.1) | 424<br>(3.3)   | 206<br>(1.6) | 12,747<br>(100.0) | 426   | 13,173 | 10.83 | 1.30 |
| SLE腎炎<br>(%)         |             |             | 3<br>(0.9)   | 7<br>(2.0)   | 17<br>(4.9)    | 48<br>(13.7)    | 119<br>(34.0)    | 96<br>(27.4)     | 40<br>(11.4)    | 10<br>(2.9)    | 10<br>(2.9)  | 350<br>(100.0)    | 13    | 363    | 10.82 | 1.37 |
| アミロイド腎<br>(%)        |             |             | 1<br>(1.8)   |              | 5<br>(8.8)     | 12<br>(21.1)    | 21<br>(36.8)     | 15<br>(26.3)     | 2<br>(3.5)      | 1<br>(1.8)     |              | 57<br>(100.0)     | 2     | 59     | 10.41 | 1.16 |
| 痛風腎<br>(%)           |             |             |              | 2<br>(1.4)   | 4<br>(2.7)     | 22<br>(15.1)    | 52<br>(35.6)     | 41<br>(28.1)     | 20<br>(13.7)    | 3<br>(2.1)     | 2<br>(1.4)   | 146<br>(100.0)    | 8     | 154    | 10.86 | 1.20 |
| 先天性代謝異常による腎不全<br>(%) |             |             | 1<br>(2.5)   |              |                | 4<br>(10.0)     | 9<br>(22.5)      | 15<br>(37.5)     | 7<br>(17.5)     | 3<br>(7.5)     | 1<br>(2.5)   | 40<br>(100.0)     | 4     | 44     | 11.32 | 1.52 |
| 腎・尿路結核<br>(%)        |             |             |              |              |                | 2<br>(9.5)      | 5<br>(23.8)      | 11<br>(52.4)     | 1<br>(4.8)      |                | 2<br>(9.5)   | 21<br>(100.0)     | 1     | 22     | 11.37 | 1.35 |
| 腎・尿路結石<br>(%)        |             |             |              | 1<br>(1.5)   | 2<br>(2.9)     | 14<br>(20.6)    | 19<br>(27.9)     | 23<br>(33.8)     | 8<br>(11.8)     | 1<br>(1.5)     |              | 68<br>(100.0)     | 1     | 69     | 10.70 | 1.10 |
| 腎・尿路腫瘍<br>(%)        |             |             | 1<br>(1.2)   | 2<br>(2.4)   | 3<br>(3.5)     | 16<br>(18.8)    | 29<br>(34.1)     | 21<br>(24.7)     | 10<br>(11.8)    | 2<br>(2.4)     | 1<br>(1.2)   | 85<br>(100.0)     |       | 85     | 10.74 | 1.33 |
| 閉塞性尿路障害<br>(%)       |             |             |              |              | 8<br>(11.4)    | 7<br>(10.0)     | 20<br>(28.6)     | 26<br>(37.1)     | 7<br>(10.0)     | 1<br>(1.4)     | 1<br>(1.4)   | 70<br>(100.0)     | 4     | 74     | 10.83 | 1.38 |
| 骨髄腫<br>(%)           |             |             |              | 1<br>(5.3)   | 2<br>(10.5)    | 3<br>(15.8)     | 5<br>(26.3)      | 6<br>(31.6)      | 2<br>(10.5)     |                |              | 19<br>(100.0)     |       | 19     | 10.57 | 1.32 |
| 腎形成不全<br>(%)         |             |             | 1<br>(1.0)   |              | 1<br>(1.0)     | 13<br>(13.3)    | 37<br>(37.8)     | 35<br>(35.7)     | 7<br>(7.1)      | 3<br>(3.1)     | 1<br>(1.0)   | 98<br>(100.0)     | 3     | 101    | 10.85 | 1.07 |
| 不明<br>(%)            | 4<br>(0.1)  | 4<br>(0.1)  | 11<br>(0.3)  | 36<br>(1.1)  | 154<br>(4.6)   | 486<br>(14.6)   | 1,144<br>(34.4)  | 1,006<br>(30.3)  | 344<br>(10.4)   | 99<br>(3.0)    | 33<br>(1.0)  | 3,321<br>(100.0)  | 159   | 3,480  | 10.80 | 1.25 |
| 再導入<br>(%)           |             |             | 1<br>(0.2)   | 4<br>(1.0)   | 19<br>(4.7)    | 63<br>(15.6)    | 130<br>(32.1)    | 129<br>(31.9)    | 45<br>(11.1)    | 11<br>(2.7)    | 3<br>(0.7)   | 405<br>(100.0)    | 11    | 416    | 10.82 | 1.25 |
| その他<br>(%)           | 1<br>(0.1)  |             | 3<br>(0.3)   | 17<br>(2.0)  | 47<br>(5.4)    | 137<br>(15.8)   | 294<br>(33.9)    | 245<br>(28.3)    | 95<br>(11.0)    | 17<br>(2.0)    | 10<br>(1.2)  | 866<br>(100.0)    | 23    | 889    | 10.73 | 1.28 |
| 合計<br>(%)            | 26<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 114<br>(0.3) | 445<br>(1.1) | 1,637<br>(4.2) | 5,850<br>(15.1) | 12,947<br>(33.4) | 11,577<br>(29.9) | 4,382<br>(11.3) | 1,185<br>(3.1) | 523<br>(1.4) | 38,717<br>(100.0) | 1,229 | 39,946 | 10.84 | 1.26 |
| 記載なし<br>(%)          |             |             |              |              |                |                 |                  |                  |                 |                |              |                   |       |        |       |      |
| 総計<br>(%)            | 26<br>(0.1) | 31<br>(0.1) | 114<br>(0.3) | 445<br>(1.1) | 1,637<br>(4.2) | 5,850<br>(15.1) | 12,947<br>(33.4) | 11,577<br>(29.9) | 4,382<br>(11.3) | 1,185<br>(3.1) | 523<br>(1.4) | 38,717<br>(100.0) | 1,229 | 39,946 | 10.84 | 1.26 |

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査