

表 3642 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (8.3)	1 (8.3)	5 (41.7)	5 (41.7)				12 (100.0)		12	10.67	0.92
20～ (%)			1 (1.4)	3 (4.1)	3 (4.1)	21 (28.8)	17 (23.3)	19 (26.0)	9 (12.3)			73 (100.0)	3	76	10.38	1.32
30～ (%)	3 (0.1)	3 (0.1)	13 (0.5)	46 (1.7)	167 (6.3)	500 (18.9)	904 (34.2)	687 (26.0)	251 (9.5)	55 (2.1)	16 (0.6)	2,645 (100.0)	37	2,682	10.59	1.28
40～ (%)	8 (0.1)	7 (0.1)	36 (0.4)	147 (1.5)	502 (5.1)	1,622 (16.5)	3,370 (34.2)	2,888 (29.3)	971 (9.9)	210 (2.1)	93 (0.9)	9,854 (100.0)	151	10,005	10.71	1.24
50～ (%)	6 (0.0)	8 (0.1)	31 (0.3)	125 (1.0)	527 (4.3)	1,948 (15.8)	4,178 (33.9)	3,582 (29.1)	1,448 (11.8)	330 (2.7)	138 (1.1)	12,321 (100.0)	169	12,490	10.82	1.23
60～ (%)	4 (0.0)	8 (0.1)	22 (0.3)	77 (0.9)	264 (3.2)	1,070 (13.0)	2,713 (32.8)	2,652 (32.1)	1,006 (12.2)	313 (3.8)	131 (1.6)	8,260 (100.0)	105	8,365	10.96	1.25
70～ (%)	4 (0.1)	3 (0.1)	8 (0.2)	28 (0.8)	85 (2.5)	428 (12.6)	1,062 (31.3)	1,074 (31.6)	445 (13.1)	174 (5.1)	83 (2.4)	3,394 (100.0)	29	3,423	11.07	1.32
80～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.3)	45 (3.6)	136 (10.8)	419 (33.4)	400 (31.8)	154 (12.3)	55 (4.4)	39 (3.1)	1,256 (100.0)	17	1,273	11.08	1.30
90～ (%)		1 (0.2)		5 (1.1)	10 (2.2)	54 (12.0)	144 (32.0)	147 (32.7)	59 (13.1)	21 (4.7)	9 (2.0)	450 (100.0)	5	455	11.06	1.27
100～ (%)					3 (2.2)	18 (12.9)	47 (33.8)	45 (32.4)	10 (7.2)	11 (7.9)	5 (3.6)	139 (100.0)	3	142	11.18	1.37
110～ (%)				1 (1.6)	2 (3.3)	9 (14.8)	24 (39.3)	15 (24.6)	6 (9.8)	4 (6.6)		61 (100.0)		61	10.79	1.19
120～ (%)					1 (2.7)	4 (10.8)	12 (32.4)	14 (37.8)	3 (8.1)	2 (5.4)	1 (2.7)	37 (100.0)		37	11.12	1.34
合計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	113 (0.3)	436 (1.1)	1,610 (4.2)	5,811 (15.1)	12,895 (33.5)	11,528 (29.9)	4,362 (11.3)	1,175 (3.1)	515 (1.3)	38,502 (100.0)	519	39,021	10.84	1.26
記載なし (%)			1 (0.5)	9 (4.2)	27 (12.6)	39 (18.1)	52 (24.2)	49 (22.8)	20 (9.3)	10 (4.7)	8 (3.7)	215 (100.0)	710	925	10.60	1.64
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	55.55	57.05	52.89	53.07	53.64	54.97	56.39	57.30	57.73	60.73	62.01	56.64	55.32	56.63		
標準偏差	13.51	14.10	11.71	12.49	12.28	12.61	12.96	13.11	12.90	13.97	14.06	13.04	12.53	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査