

表 3646 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)							2 (100.0)					2 (100.0)		2	10.60	0.28
60～ (%)			2 (1.8)	6 (5.3)	11 (9.7)	21 (18.6)	27 (23.9)	31 (27.4)	10 (8.8)	3 (2.7)	2 (1.8)	113 (100.0)	2	115	10.45	1.54
80～ (%)		1 (0.2)	7 (1.2)	14 (2.3)	36 (6.0)	111 (18.4)	168 (27.8)	149 (24.7)	77 (12.7)	27 (4.5)	14 (2.3)	604 (100.0)	11	615	10.77	1.53
100～ (%)	1 (0.0)	4 (0.1)	16 (0.6)	59 (2.1)	159 (5.7)	422 (15.2)	858 (30.9)	787 (28.4)	341 (12.3)	82 (3.0)	46 (1.7)	2,775 (100.0)	25	2,800	10.77	1.38
120～ (%)	3 (0.0)	14 (0.2)	31 (0.4)	94 (1.2)	320 (4.2)	1,187 (15.7)	2,440 (32.3)	2,268 (30.0)	837 (11.1)	251 (3.3)	108 (1.4)	7,553 (100.0)	86	7,639	10.83	1.30
140～ (%)	8 (0.1)	3 (0.0)	25 (0.2)	110 (1.0)	452 (4.0)	1,624 (14.4)	3,957 (35.0)	3,411 (30.2)	1,269 (11.2)	314 (2.8)	128 (1.1)	11,301 (100.0)	132	11,433	10.84	1.21
160～ (%)	10 (0.1)	4 (0.0)	13 (0.2)	67 (0.8)	304 (3.7)	1,248 (15.2)	2,795 (34.0)	2,498 (30.3)	960 (11.7)	232 (2.8)	100 (1.2)	8,231 (100.0)	77	8,308	10.86	1.21
180～ (%)		3 (0.1)	6 (0.2)	37 (1.2)	128 (4.1)	457 (14.6)	1,065 (34.1)	948 (30.3)	336 (10.8)	102 (3.3)	43 (1.4)	3,125 (100.0)	29	3,154	10.85	1.24
200～ (%)	1 (0.1)		2 (0.2)	10 (1.2)	38 (4.7)	128 (15.7)	275 (33.7)	254 (31.2)	74 (9.1)	27 (3.3)	6 (0.7)	815 (100.0)	7	822	10.77	1.23
220～ (%)			2 (0.9)	1 (0.5)	9 (4.3)	44 (20.9)	63 (29.9)	53 (25.1)	25 (11.8)	9 (4.3)	5 (2.4)	211 (100.0)	5	216	10.86	1.44
合計 (%)	23 (0.1)	29 (0.1)	104 (0.3)	398 (1.1)	1,457 (4.2)	5,242 (15.1)	11,650 (33.5)	10,399 (29.9)	3,929 (11.3)	1,047 (3.0)	452 (1.3)	34,730 (100.0)	374	35,104	10.84	1.26
記載なし (%)	3 (0.1)	2 (0.1)	10 (0.3)	47 (1.2)	180 (4.5)	608 (15.2)	1,297 (32.5)	1,178 (29.5)	453 (11.4)	138 (3.5)	71 (1.8)	3,987 (100.0)	855	4,842	10.86	1.30
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	156.22	140.21	139.00	143.84	148.21	150.35	151.43	151.06	150.21	150.28	148.34	150.68	149.75	150.67		
標準偏差	19.79	25.19	32.15	28.02	26.92	25.84	24.39	24.54	25.04	26.24	26.81	25.03	26.04	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査