

表 3649 ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	4	11	17	68	200	556	1,091	1,113	525	166	55	3,806	1,936	5,742	10.86	1.42
(%)	(0.1)	(0.3)	(0.4)	(1.8)	(5.3)	(14.6)	(28.7)	(29.2)	(13.8)	(4.4)	(1.4)	(100.0)				
女性	3	3	11	56	144	347	615	596	271	71	24	2,141	1,058	3,199	10.72	1.41
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(2.6)	(6.7)	(16.2)	(28.7)	(27.8)	(12.7)	(3.3)	(1.1)	(100.0)				
合計	7	14	28	124	344	903	1,706	1,709	796	237	79	5,947	2,994	8,941	10.81	1.42
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(2.1)	(5.8)	(15.2)	(28.7)	(28.7)	(13.4)	(4.0)	(1.3)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	7	14	28	124	344	903	1,706	1,709	796	237	79	5,947	2,994	8,941	10.81	1.42
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(2.1)	(5.8)	(15.2)	(28.7)	(28.7)	(13.4)	(4.0)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査