

表 3650 ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				2 (3.6)	5 (8.9)	9 (16.1)	21 (37.5)	13 (23.2)	3 (5.4)	1 (1.8)	2 (3.6)	56 (100.0)	41	97	10.52	1.43
15歳～ (%)				1 (1.2)	10 (12.3)	11 (13.6)	19 (23.5)	22 (27.2)	15 (18.5)	2 (2.5)	1 (1.2)	81 (100.0)	30	111	10.81	1.41
30歳～ (%)		1 (0.2)	2 (0.4)	14 (3.0)	28 (6.0)	73 (15.8)	128 (27.6)	131 (28.3)	65 (14.0)	15 (3.2)	6 (1.3)	463 (100.0)	238	701	10.76	1.41
45歳～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	8 (0.5)	35 (2.3)	87 (5.7)	219 (14.3)	450 (29.3)	430 (28.0)	218 (14.2)	63 (4.1)	20 (1.3)	1,534 (100.0)	768	2,302	10.84	1.40
60歳～ (%)	5 (0.2)	6 (0.2)	11 (0.4)	47 (1.7)	142 (5.3)	430 (16.0)	778 (28.9)	777 (28.9)	353 (13.1)	110 (4.1)	32 (1.2)	2,691 (100.0)	1,343	4,034	10.82	1.40
75歳～ (%)	1 (0.1)	4 (0.4)	7 (0.7)	22 (2.1)	64 (6.1)	156 (14.8)	286 (27.1)	317 (30.1)	138 (13.1)	43 (4.1)	16 (1.5)	1,054 (100.0)	537	1,591	10.81	1.48
90歳～ (%)				3 (4.4)	8 (11.8)	5 (7.4)	24 (35.3)	19 (27.9)	4 (5.9)	3 (4.4)	2 (2.9)	68 (100.0)	37	105	10.62	1.51
合計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
不明 (%)																
記載なし (%)																
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	68.00	65.29	64.00	61.21	61.74	62.40	62.51	62.83	61.87	62.88	62.25	62.46	62.43	62.45		
標準偏差	8.33	11.68	12.93	16.37	16.46	14.24	14.55	14.01	13.93	13.43	16.64	14.39	14.81	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査