

表 3651 ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	3 (0.1)	9 (0.4)	11 (0.5)	46 (1.9)	127 (5.3)	359 (15.0)	687 (28.7)	682 (28.5)	339 (14.2)	100 (4.2)	27 (1.1)	2,390 (100.0)	1,210	3,600	10.82	1.41
2年～ (%)	3 (0.1)	4 (0.2)	9 (0.4)	45 (2.2)	126 (6.1)	338 (16.3)	595 (28.6)	594 (28.6)	258 (12.4)	81 (3.9)	27 (1.3)	2,080 (100.0)	1,121	3,201	10.78	1.43
5年～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.4)	29 (2.6)	74 (6.5)	166 (14.6)	326 (28.7)	341 (30.0)	137 (12.1)	39 (3.4)	16 (1.4)	1,135 (100.0)	522	1,657	10.78	1.40
10年～ (%)			2 (0.9)	1 (0.4)	10 (4.3)	28 (12.1)	67 (28.9)	66 (28.4)	44 (19.0)	10 (4.3)	4 (1.7)	232 (100.0)	108	340	11.07	1.31
15年～ (%)			1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	5 (6.8)	26 (35.6)	21 (28.8)	8 (11.0)	5 (6.8)	3 (4.1)	73 (100.0)	24	97	11.07	1.46
20年～ (%)					1 (6.3)	5 (31.3)	2 (12.5)	2 (12.5)	4 (25.0)	1 (6.3)	1 (6.3)	16 (100.0)	4	20	11.27	2.01
25年～ (%)					1 (12.5)		2 (25.0)		3 (37.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)		8	11.66	1.66
30年～ (%)				2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)		3 (37.5)			8 (100.0)	2	10	10.14	2.10
35年～ (%)					1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)				3 (100.0)		3	9.97	1.29
40年～ (%)																
合計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,707 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,945 (100.0)	2,991	8,936	10.81	1.42
不明 (%)								2 (100.0)				2 (100.0)	3	5	11.25	0.07
記載なし (%)																
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	2.29	1.43	3.68	3.53	3.35	2.99	3.13	3.11	3.35	3.21	4.27	3.17	2.96	3.10		
標準偏差	2.21	1.83	4.03	4.68	4.19	3.56	3.50	3.43	4.21	4.09	5.12	3.71	3.24	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査