

表 3652 ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	7 (0.3)	38 (1.8)	123 (6.0)	295 (14.3)	590 (28.7)	631 (30.7)	264 (12.8)	76 (3.7)	29 (1.4)	2,057 (100.0)	1,002	3,059	10.84	1.36
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (1.5)	5 (7.4)	6 (8.8)	19 (27.9)	23 (33.8)	7 (10.3)	5 (7.4)	2 (2.9)	68 (100.0)	25	93	11.09	1.45
急速進行性糸球 体腎炎 (%)					4 (8.2)	9 (18.4)	14 (28.6)	11 (22.4)	8 (16.3)	2 (4.1)	1 (2.0)	49 (100.0)	25	74	10.83	1.35
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			1 (4.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	2 (8.0)	5 (20.0)	11 (44.0)	3 (12.0)	1 (4.0)		25 (100.0)	7	32	10.74	1.53
その他の分類不 能の腎炎 (%)				1 (1.7)	2 (3.4)	10 (17.2)	15 (25.9)	18 (31.0)	9 (15.5)	2 (3.4)	1 (1.7)	58 (100.0)	27	85	10.97	1.28
多発性嚢胞腎 (%)			2 (1.3)	3 (2.0)	10 (6.6)	17 (11.2)	27 (17.8)	57 (37.5)	25 (16.4)	10 (6.6)	1 (0.7)	152 (100.0)	91	243	11.03	1.45
腎硬化症 (%)		1 (0.1)	5 (0.7)	9 (1.2)	34 (4.6)	118 (16.0)	235 (31.8)	211 (28.6)	89 (12.1)	24 (3.3)	12 (1.6)	738 (100.0)	345	1,083	10.82	1.33
悪性高血圧 (%)				5 (7.4)	2 (2.9)	9 (13.2)	24 (35.3)	16 (23.5)	9 (13.2)	3 (4.4)		68 (100.0)	39	107	10.65	1.42
糖尿病性腎症 (%)	4 (0.2)	7 (0.4)	10 (0.6)	45 (2.5)	116 (6.4)	286 (15.8)	500 (27.7)	492 (27.2)	246 (13.6)	77 (4.3)	23 (1.3)	1,806 (100.0)	960	2,766	10.76	1.50
SLE腎炎 (%)				1 (2.3)	3 (7.0)	9 (20.9)	15 (34.9)	9 (20.9)	5 (11.6)	1 (2.3)		43 (100.0)	19	62	10.50	1.30
アミロイド腎 (%)								3 (75.0)	1 (25.0)			4 (100.0)	5	9	11.50	0.50
痛風腎 (%)					2 (8.0)	5 (20.0)	6 (24.0)	9 (36.0)	1 (4.0)	2 (8.0)		25 (100.0)	8	33	10.81	1.35
先天性代謝異常 による腎不全 (%)					1 (7.1)	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)	5 (35.7)		1 (7.1)	14 (100.0)	4	18	11.26	1.50
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)					1 (100.0)		1	10.50	
腎・尿路結石 (%)							2 (20.0)	6 (60.0)	2 (20.0)			10 (100.0)	6	16	11.48	0.79
腎・尿路腫瘍 (%)					1 (11.1)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)		9 (100.0)	5	14	10.56	1.51
閉塞性尿路障害 (%)					1 (6.3)	3 (18.8)	5 (31.3)	4 (25.0)	2 (12.5)	1 (6.3)		16 (100.0)	6	22	11.04	1.38
骨髄腫 (%)				1 (20.0)	2 (40.0)		1 (20.0)		1 (20.0)			5 (100.0)	3	8	9.54	2.05
腎形成不全 (%)				2 (3.6)	5 (9.1)	8 (14.5)	15 (27.3)	11 (20.0)	13 (23.6)	1 (1.8)		55 (100.0)	21	76	10.65	1.45
不明 (%)	1 (0.2)	3 (0.6)	2 (0.4)	12 (2.2)	25 (4.6)	88 (16.1)	168 (30.8)	143 (26.2)	76 (13.9)	22 (4.0)	5 (0.9)	545 (100.0)	295	840	10.77	1.41
再導入 (%)				1 (2.8)	3 (8.3)	4 (11.1)	12 (33.3)	6 (16.7)	8 (22.2)	2 (5.6)		36 (100.0)	15	51	10.90	1.45
その他 (%)	1 (0.6)		1 (0.6)	4 (2.5)	4 (2.5)	30 (18.4)	46 (28.2)	45 (27.6)	21 (12.9)	7 (4.3)	4 (2.5)	163 (100.0)	86	249	10.80	1.57
合計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
記載なし (%)																
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査