

表 3658 ヘモグロビン濃度(g/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)							1 (100.0)					1 (100.0)		1	10.60	
60～ (%)				1 (7.7)		1 (7.7)	5 (38.5)	3 (23.1)	2 (15.4)	1 (7.7)		13 (100.0)		13	10.88	1.45
80～ (%)			1 (0.8)	5 (4.2)	6 (5.0)	24 (20.2)	32 (26.9)	27 (22.7)	15 (12.6)	6 (5.0)	3 (2.5)	119 (100.0)	5	124	10.76	1.56
100～ (%)			3 (0.5)	10 (1.6)	28 (4.5)	82 (13.1)	166 (26.6)	195 (31.3)	102 (16.3)	25 (4.0)	13 (2.1)	624 (100.0)	17	641	11.00	1.39
120～ (%)	4 (0.3)	7 (0.5)	5 (0.3)	19 (1.3)	73 (5.0)	195 (13.3)	405 (27.6)	454 (30.9)	224 (15.2)	65 (4.4)	19 (1.3)	1,470 (100.0)	46	1,516	10.93	1.42
140～ (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	6 (0.4)	29 (1.9)	86 (5.6)	238 (15.6)	445 (29.2)	449 (29.4)	189 (12.4)	64 (4.2)	16 (1.0)	1,525 (100.0)	54	1,579	10.81	1.37
160～ (%)			3 (0.4)	18 (2.6)	40 (5.7)	117 (16.6)	213 (30.2)	193 (27.4)	89 (12.6)	25 (3.5)	7 (1.0)	705 (100.0)	16	721	10.75	1.37
180～ (%)	1 (0.5)	2 (1.0)		6 (2.9)	14 (6.7)	43 (20.5)	58 (27.6)	51 (24.3)	22 (10.5)	7 (3.3)	6 (2.9)	210 (100.0)	7	217	10.62	1.63
200～ (%)					5 (16.1)	5 (16.1)	5 (16.1)	5 (16.1)	8 (25.8)	1 (3.2)	2 (6.5)	31 (100.0)		31	10.92	1.79
220～ (%)					3 (30.0)	1 (10.0)		3 (30.0)	3 (30.0)			10 (100.0)		10	10.64	1.65
合計 (%)	6 (0.1)	11 (0.2)	18 (0.4)	88 (1.9)	255 (5.4)	706 (15.0)	1,330 (28.2)	1,380 (29.3)	654 (13.9)	194 (4.1)	66 (1.4)	4,708 (100.0)	145	4,853	10.85	1.41
記載なし (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	10 (0.8)	36 (2.9)	89 (7.2)	197 (15.9)	376 (30.3)	329 (26.6)	142 (11.5)	43 (3.5)	13 (1.0)	1,239 (100.0)	2,849	4,088	10.65	1.42
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	145.17	144.00	136.83	142.72	145.21	142.80	141.48	140.18	139.14	138.79	140.56	141.06	139.24	141.01		
標準偏差	24.14	20.70	22.72	25.93	25.14	23.51	22.47	21.89	23.41	22.81	28.02	22.94	20.78	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査