

表 3659 ヘモグロビン濃度(g/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)						1 (100.0)		1	9.40	
20～ (%)				2 (13.3)	1 (6.7)	4 (26.7)	5 (33.3)	2 (13.3)	1 (6.7)			15 (100.0)		15	10.03	1.56
40～ (%)		1 (0.3)	2 (0.6)	12 (3.4)	28 (7.8)	51 (14.2)	125 (34.9)	83 (23.2)	44 (12.3)	9 (2.5)	3 (0.8)	358 (100.0)	17	375	10.62	1.37
60～ (%)	4 (0.2)	8 (0.4)	6 (0.3)	33 (1.6)	103 (5.1)	306 (15.3)	553 (27.6)	595 (29.7)	282 (14.1)	85 (4.2)	29 (1.4)	2,004 (100.0)	61	2,065	10.87	1.42
80～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	8 (0.6)	16 (1.3)	57 (4.5)	193 (15.3)	346 (27.5)	385 (30.6)	179 (14.2)	53 (4.2)	19 (1.5)	1,259 (100.0)	37	1,296	10.91	1.39
90～ (%)		1 (0.1)	2 (0.3)	19 (2.7)	44 (6.3)	91 (13.1)	199 (28.6)	213 (30.6)	90 (12.9)	27 (3.9)	11 (1.6)	697 (100.0)	17	714	10.84	1.44
100～ (%)				5 (1.5)	19 (5.7)	51 (15.3)	91 (27.2)	96 (28.7)	49 (14.7)	19 (5.7)	4 (1.2)	334 (100.0)	13	347	10.92	1.38
120～ (%)					3 (16.7)	3 (16.7)	4 (22.2)		6 (33.3)	2 (11.1)		18 (100.0)		18	10.94	1.63
140～ (%)								1 (100.0)				1 (100.0)		1	11.20	
合計 (%)	6 (0.1)	11 (0.2)	18 (0.4)	87 (1.9)	255 (5.4)	700 (14.9)	1,323 (28.2)	1,375 (29.3)	651 (13.9)	195 (4.2)	66 (1.4)	4,687 (100.0)	145	4,832	10.86	1.41
記載なし (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	10 (0.8)	37 (2.9)	89 (7.1)	203 (16.1)	383 (30.4)	334 (26.5)	145 (11.5)	42 (3.3)	13 (1.0)	1,260 (100.0)	2,849	4,109	10.64	1.42
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	75.50	72.36	76.94	77.31	78.96	78.48	78.46	79.51	79.60	80.74	79.53	79.02	78.66	79.01		
標準偏差	8.02	10.98	12.34	17.49	15.81	14.53	14.77	13.60	14.51	14.03	13.38	14.41	15.11	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査