

表 3660 ヘモグロビン濃度(g/dL) 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)					2 (40.0)		1 (20.0)	2 (40.0)				5 (100.0)		5	10.04	1.38
40～ (%)				1 (4.2)	1 (4.2)	2 (8.3)	12 (50.0)	4 (16.7)	1 (4.2)	1 (4.2)	2 (8.3)	24 (100.0)	1	25	10.95	1.64
50～ (%)		2 (1.1)	2 (1.1)	3 (1.7)	5 (2.9)	18 (10.3)	59 (33.9)	52 (29.9)	25 (14.4)	4 (2.3)	4 (2.3)	174 (100.0)	13	187	10.86	1.47
60～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)		14 (1.7)	48 (5.9)	125 (15.2)	215 (26.2)	249 (30.4)	116 (14.1)	34 (4.1)	17 (2.1)	820 (100.0)	30	850	10.91	1.42
70～ (%)	2 (0.2)	3 (0.2)	6 (0.5)	26 (2.1)	55 (4.5)	181 (14.7)	367 (29.9)	357 (29.0)	170 (13.8)	50 (4.1)	12 (1.0)	1,229 (100.0)	42	1,271	10.84	1.40
80～ (%)	1 (0.1)	4 (0.4)	6 (0.6)	20 (2.0)	59 (5.9)	159 (15.9)	272 (27.3)	296 (29.7)	134 (13.4)	38 (3.8)	9 (0.9)	998 (100.0)	26	1,024	10.77	1.40
90～ (%)			3 (0.6)	5 (1.1)	28 (6.0)	72 (15.4)	136 (29.0)	132 (28.1)	61 (13.0)	21 (4.5)	11 (2.3)	469 (100.0)	12	481	10.92	1.39
100～ (%)	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	7 (3.6)	12 (6.2)	30 (15.5)	55 (28.4)	48 (24.7)	25 (12.9)	11 (5.7)	3 (1.5)	194 (100.0)	10	204	10.71	1.58
110～ (%)				1 (2.0)	3 (6.1)	6 (12.2)	13 (26.5)	18 (36.7)	7 (14.3)	1 (2.0)		49 (100.0)	3	52	10.86	1.17
120～ (%)				1 (5.6)		3 (16.7)	8 (44.4)	5 (27.8)			1 (5.6)	18 (100.0)	2	20	10.56	1.37
合計 (%)	5 (0.1)	11 (0.3)	18 (0.5)	78 (2.0)	213 (5.4)	596 (15.0)	1,138 (28.6)	1,163 (29.2)	539 (13.5)	160 (4.0)	59 (1.5)	3,980 (100.0)	139	4,119	10.84	1.42
記載なし (%)	2 (0.1)	3 (0.2)	10 (0.5)	46 (2.3)	131 (6.7)	307 (15.6)	568 (28.9)	546 (27.8)	257 (13.1)	77 (3.9)	20 (1.0)	1,967 (100.0)	2,855	4,822	10.75	1.42
総計 (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	28 (0.5)	124 (2.1)	344 (5.8)	903 (15.2)	1,706 (28.7)	1,709 (28.7)	796 (13.4)	237 (4.0)	79 (1.3)	5,947 (100.0)	2,994	8,941	10.81	1.42
平均	80.60	76.64	79.61	79.36	78.73	78.66	77.99	77.79	77.97	78.61	77.03	78.11	77.37	78.09		
標準偏差	15.95	13.50	11.86	14.60	14.08	12.73	13.54	12.96	12.51	12.65	17.14	13.18	15.56	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査