

表 3661 総コレステロール濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	6,719 (3.9)	19,356 (11.1)	35,622 (20.5)	40,372 (23.2)	32,879 (18.9)	20,482 (11.8)	10,704 (6.2)	4,705 (2.7)	1,822 (1.0)	1,199 (0.7)	173,860 (100.0)	81,781	255,641	154.84	35.39
血液透析濾過 （％）	1,024 (3.3)	3,063 (9.9)	5,821 (18.7)	7,101 (22.8)	6,170 (19.8)	3,992 (12.8)	2,316 (7.5)	984 (3.2)	394 (1.3)	222 (0.7)	31,087 (100.0)	12,196	43,283	158.04	35.72
血液濾過 （％）	1 (1.2)	8 (9.4)	16 (18.8)	21 (24.7)	19 (22.4)	10 (11.8)	3 (3.5)	5 (5.9)	1 (1.2)	1 (1.2)	85 (100.0)	7	92	159.69	36.93
血液吸着透析 （％）	35 (2.8)	121 (9.5)	261 (20.6)	301 (23.7)	245 (19.3)	155 (12.2)	94 (7.4)	37 (2.9)	13 (1.0)	6 (0.5)	1,268 (100.0)	362	1,630	157.15	34.30
在宅血液透析 （％）	1 (0.3)	14 (4.5)	33 (10.7)	58 (18.8)	65 (21.1)	53 (17.2)	42 (13.6)	22 (7.1)	11 (3.6)	9 (2.9)	308 (100.0)	213	521	178.62	38.71
腹膜透析 （％）	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
合計 （％）	7,830 (3.7)	22,722 (10.8)	42,201 (20.0)	48,659 (23.1)	40,243 (19.1)	25,525 (12.1)	13,723 (6.5)	6,071 (2.9)	2,400 (1.1)	1,586 (0.8)	210,960 (100.0)	99,148	310,108	155.86	35.74
記載なし （％）															
総計 （％）	7,830 (3.7)	22,722 (10.8)	42,201 (20.0)	48,659 (23.1)	40,243 (19.1)	25,525 (12.1)	13,723 (6.5)	6,071 (2.9)	2,400 (1.1)	1,586 (0.8)	210,960 (100.0)	99,148	310,108	155.86	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査