

表 3675 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	5,369	14,857	25,374	25,780	18,585	9,931	4,541	1,793	603	390	107,223	39,810	147,033	148.15	33.01
(%)	(5.0)	(13.9)	(23.7)	(24.0)	(17.3)	(9.3)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.4)	(100.0)				
女性	1,085	3,763	8,941	13,046	12,998	9,688	5,668	2,682	1,130	721	59,722	22,216	81,938	166.50	36.16
(%)	(1.8)	(6.3)	(15.0)	(21.8)	(21.8)	(16.2)	(9.5)	(4.5)	(1.9)	(1.2)	(100.0)				
合計	6,454	18,620	34,315	38,826	31,583	19,619	10,209	4,475	1,733	1,111	166,945	62,026	228,971	154.71	35.28
(%)	(3.9)	(11.2)	(20.6)	(23.3)	(18.9)	(11.8)	(6.1)	(2.7)	(1.0)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	6,454	18,620	34,315	38,826	31,583	19,619	10,209	4,475	1,733	1,111	166,945	62,026	228,971	154.71	35.28
(%)	(3.9)	(11.2)	(20.6)	(23.3)	(18.9)	(11.8)	(6.1)	(2.7)	(1.0)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査