

表 3686 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	825	2,425	4,271	4,613	3,551	1,965	926	347	126	65	19,114	6,080	25,194	150.50	33.12
(%)	(4.3)	(12.7)	(22.3)	(24.1)	(18.6)	(10.3)	(4.8)	(1.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)				
女性	167	563	1,423	2,292	2,460	1,908	1,327	609	258	151	11,158	3,594	14,752	170.86	36.27
(%)	(1.5)	(5.0)	(12.8)	(20.5)	(22.0)	(17.1)	(11.9)	(5.5)	(2.3)	(1.4)	(100.0)				
合計	992	2,988	5,694	6,905	6,011	3,873	2,253	956	384	216	30,272	9,674	39,946	158.00	35.70
(%)	(3.3)	(9.9)	(18.8)	(22.8)	(19.9)	(12.8)	(7.4)	(3.2)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	992	2,988	5,694	6,905	6,011	3,873	2,253	956	384	216	30,272	9,674	39,946	158.00	35.70
(%)	(3.3)	(9.9)	(18.8)	(22.8)	(19.9)	(12.8)	(7.4)	(3.2)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査