

表 3695 総コレステロール濃度(mg/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					2 (50.0)		2 (50.0)				4 (100.0)	3	7	194.00	18.00
20～ (%)	2 (2.1)	12 (12.5)	20 (20.8)	28 (29.2)	18 (18.8)	11 (11.5)	4 (4.2)		1 (1.0)		96 (100.0)	25	121	150.67	27.78
40～ (%)	115 (5.3)	280 (12.9)	447 (20.6)	476 (21.9)	384 (17.7)	251 (11.6)	138 (6.4)	49 (2.3)	18 (0.8)	15 (0.7)	2,173 (100.0)	507	2,680	152.32	36.57
60～ (%)	450 (3.6)	1,318 (10.6)	2,450 (19.6)	2,924 (23.4)	2,371 (19.0)	1,496 (12.0)	853 (6.8)	386 (3.1)	139 (1.1)	85 (0.7)	12,472 (100.0)	2,500	14,972	156.23	35.53
80～ (%)	229 (3.1)	662 (8.9)	1,387 (18.6)	1,693 (22.7)	1,534 (20.5)	994 (13.3)	584 (7.8)	233 (3.1)	94 (1.3)	58 (0.8)	7,468 (100.0)	1,535	9,003	159.28	35.45
90～ (%)	104 (2.3)	412 (9.2)	791 (17.6)	1,014 (22.6)	971 (21.6)	578 (12.9)	357 (7.9)	163 (3.6)	71 (1.6)	31 (0.7)	4,492 (100.0)	825	5,317	160.46	35.61
100～ (%)	63 (2.8)	191 (8.4)	387 (17.0)	495 (21.7)	440 (19.3)	346 (15.2)	217 (9.5)	81 (3.6)	37 (1.6)	19 (0.8)	2,276 (100.0)	425	2,701	162.30	36.19
120～ (%)	2 (1.4)	9 (6.3)	19 (13.3)	25 (17.5)	43 (30.1)	20 (14.0)	11 (7.7)	6 (4.2)	6 (4.2)	2 (1.4)	143 (100.0)	26	169	168.89	36.86
140～ (%)			2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	3 (33.3)	1 (11.1)				9 (100.0)	3	12	169.33	26.12
合計 (%)	965 (3.3)	2,884 (9.9)	5,503 (18.9)	6,656 (22.8)	5,765 (19.8)	3,699 (12.7)	2,167 (7.4)	918 (3.2)	366 (1.3)	210 (0.7)	29,133 (100.0)	5,849	34,982	157.90	35.73
記載なし (%)	27 (2.4)	104 (9.1)	191 (16.8)	249 (21.9)	246 (21.6)	174 (15.3)	86 (7.6)	38 (3.3)	18 (1.6)	6 (0.5)	1,139 (100.0)	3,825	4,964	160.75	34.66
総計 (%)	992 (3.3)	2,988 (9.9)	5,694 (18.8)	6,905 (22.8)	6,011 (19.9)	3,873 (12.8)	2,253 (7.4)	956 (3.2)	384 (1.3)	216 (0.7)	30,272 (100.0)	9,674	39,946	158.00	35.70
平均	76.19	77.47	78.47	79.05	80.01	80.32	80.80	80.78	82.23	80.76	79.28	78.64	79.17		
標準偏差	14.80	14.71	14.51	14.44	14.66	14.80	14.81	14.27	15.41	14.56	14.66	14.89	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査