

表 3697 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	39	123	370	601	571	484	296	145	64	49	2,742	3,000	5,742	170.89	37.62
(%)	(1.4)	(4.5)	(13.5)	(21.9)	(20.8)	(17.7)	(10.8)	(5.3)	(2.3)	(1.8)	(100.0)				
女性	11	37	78	205	294	349	268	173	95	100	1,610	1,589	3,199	192.85	41.58
(%)	(0.7)	(2.3)	(4.8)	(12.7)	(18.3)	(21.7)	(16.6)	(10.7)	(5.9)	(6.2)	(100.0)				
合計	50	160	448	806	865	833	564	318	159	149	4,352	4,589	8,941	179.01	40.54
(%)	(1.1)	(3.7)	(10.3)	(18.5)	(19.9)	(19.1)	(13.0)	(7.3)	(3.7)	(3.4)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	50	160	448	806	865	833	564	318	159	149	4,352	4,589	8,941	179.01	40.54
(%)	(1.1)	(3.7)	(10.3)	(18.5)	(19.9)	(19.1)	(13.0)	(7.3)	(3.7)	(3.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査