

表 3699 総コレステロール濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	14 (0.8)	62 (3.7)	158 (9.5)	289 (17.4)	315 (18.9)	326 (19.6)	217 (13.0)	125 (7.5)	75 (4.5)	83 (5.0)	1,664 (100.0)	1,936	3,600	182.70	42.58
2年～ (%)	22 (1.4)	48 (3.2)	152 (10.0)	289 (19.0)	294 (19.4)	300 (19.8)	207 (13.6)	115 (7.6)	52 (3.4)	39 (2.6)	1,518 (100.0)	1,683	3,201	178.17	39.61
5年～ (%)	13 (1.5)	33 (3.7)	107 (12.1)	169 (19.1)	196 (22.1)	163 (18.4)	104 (11.7)	59 (6.7)	20 (2.3)	22 (2.5)	886 (100.0)	771	1,657	174.70	37.54
10年～ (%)		6 (3.1)	20 (10.5)	47 (24.6)	42 (22.0)	28 (14.7)	23 (12.0)	14 (7.3)	9 (4.7)	2 (1.0)	191 (100.0)	149	340	175.77	35.02
15年～ (%)		8 (12.5)	9 (14.1)	9 (14.1)	14 (21.9)	10 (15.6)	7 (10.9)	3 (4.7)	2 (3.1)	2 (3.1)	64 (100.0)	33	97	170.63	46.41
20年～ (%)			2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)		1 (10.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	10	20	199.00	76.97
25年～ (%)		1 (12.5)		2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)				8 (100.0)		8	177.13	35.88
30年～ (%)	1 (12.5)	2 (25.0)			1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)			8 (100.0)	2	10	164.25	55.18
35年～ (%)					1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)			3 (100.0)		3	192.33	32.32
40年～ (%)															
合計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,584	8,936	179.01	40.54
不明 (%)												5	5		
記載なし (%)															
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
平均	3.74	4.24	3.49	3.48	3.47	3.19	3.36	3.19	2.91	2.38	3.36	2.85	3.10		
標準偏差	4.72	5.45	3.59	3.70	3.89	3.73	4.10	4.09	3.64	3.45	3.90	3.19	3.56		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査