

表 3701 総コレステロール濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	4	3	33	57	73	88	46	34	15	14	367	346	713	184.99	40.73
(%)	(1.1)	(0.8)	(9.0)	(15.5)	(19.9)	(24.0)	(12.5)	(9.3)	(4.1)	(3.8)	(100.0)				
私立大学	2	15	27	78	81	91	78	45	16	20	453	680	1,133	186.43	40.54
(%)	(0.4)	(3.3)	(6.0)	(17.2)	(17.9)	(20.1)	(17.2)	(9.9)	(3.5)	(4.4)	(100.0)				
国立	2	1	6	14	16	23	11	9	6	4	92	110	202	187.33	43.79
(%)	(2.2)	(1.1)	(6.5)	(15.2)	(17.4)	(25.0)	(12.0)	(9.8)	(6.5)	(4.3)	(100.0)				
県市町村立	8	33	86	142	122	108	77	41	28	30	675	911	1,586	176.29	43.33
(%)	(1.2)	(4.9)	(12.7)	(21.0)	(18.1)	(16.0)	(11.4)	(6.1)	(4.1)	(4.4)	(100.0)				
社会保険		6	20	28	27	33	20	15	7	5	161	326	487	180.66	39.71
(%)		(3.7)	(12.4)	(17.4)	(16.8)	(20.5)	(12.4)	(9.3)	(4.3)	(3.1)	(100.0)				
厚生連	4	17	47	65	83	70	44	20	18	11	379	247	626	175.89	38.20
(%)	(1.1)	(4.5)	(12.4)	(17.2)	(21.9)	(18.5)	(11.6)	(5.3)	(4.7)	(2.9)	(100.0)				
その他公的	10	29	70	120	154	136	102	57	25	24	727	592	1,319	179.87	40.99
(%)	(1.4)	(4.0)	(9.6)	(16.5)	(21.2)	(18.7)	(14.0)	(7.8)	(3.4)	(3.3)	(100.0)				
私立総合	1	12	25	39	43	33	32	14	8	8	215	162	377	178.17	42.14
(%)	(0.5)	(5.6)	(11.6)	(18.1)	(20.0)	(15.3)	(14.9)	(6.5)	(3.7)	(3.7)	(100.0)				
私立	11	28	90	160	163	153	94	55	21	23	798	891	1,689	175.93	39.31
(%)	(1.4)	(3.5)	(11.3)	(20.1)	(20.4)	(19.2)	(11.8)	(6.9)	(2.6)	(2.9)	(100.0)				
私立診療所	8	16	44	103	103	98	60	28	15	10	485	324	809	175.82	36.85
(%)	(1.6)	(3.3)	(9.1)	(21.2)	(21.2)	(20.2)	(12.4)	(5.8)	(3.1)	(2.1)	(100.0)				
総計	50	160	448	806	865	833	564	318	159	149	4,352	4,589	8,941	179.01	40.54
(%)	(1.1)	(3.7)	(10.3)	(18.5)	(19.9)	(19.1)	(13.0)	(7.3)	(3.7)	(3.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査