

表 3705 総コレステロール濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)		1	303.00	
60～ (%)		4 (33.3)		2 (16.7)	3 (25.0)	2 (16.7)				1 (8.3)	12 (100.0)	1	13	163.08	64.63
80～ (%)	2 (2.1)	5 (5.2)	18 (18.6)	12 (12.4)	17 (17.5)	15 (15.5)	16 (16.5)	5 (5.2)	5 (5.2)	2 (2.1)	97 (100.0)	27	124	174.99	44.54
100～ (%)	10 (2.1)	15 (3.1)	50 (10.4)	76 (15.8)	100 (20.8)	90 (18.8)	63 (13.1)	43 (9.0)	15 (3.1)	18 (3.8)	480 (100.0)	161	641	180.34	43.60
120～ (%)	7 (0.6)	41 (3.5)	119 (10.2)	230 (19.6)	203 (17.3)	236 (20.2)	156 (13.3)	94 (8.0)	39 (3.3)	46 (3.9)	1,171 (100.0)	345	1,516	180.23	40.35
140～ (%)	16 (1.3)	45 (3.6)	132 (10.5)	230 (18.3)	259 (20.6)	242 (19.3)	168 (13.4)	86 (6.9)	42 (3.3)	35 (2.8)	1,255 (100.0)	324	1,579	177.73	38.85
160～ (%)	5 (0.9)	23 (4.1)	68 (12.0)	105 (18.5)	117 (20.6)	102 (18.0)	68 (12.0)	41 (7.2)	21 (3.7)	17 (3.0)	567 (100.0)	154	721	177.27	39.67
180～ (%)	1 (0.6)	9 (5.3)	16 (9.5)	37 (21.9)	38 (22.5)	29 (17.2)	19 (11.2)	8 (4.7)	10 (5.9)	2 (1.2)	169 (100.0)	48	217	174.76	37.60
200～ (%)		1 (4.0)	2 (8.0)	6 (24.0)	3 (12.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	25 (100.0)	6	31	185.24	45.98
220～ (%)			1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)			7 (100.0)	3	10	179.57	30.64
合計 (%)	41 (1.1)	143 (3.8)	406 (10.7)	699 (18.5)	742 (19.6)	722 (19.1)	493 (13.0)	280 (7.4)	134 (3.5)	124 (3.3)	3,784 (100.0)	1,069	4,853	178.60	40.35
記載なし (%)	9 (1.6)	17 (3.0)	42 (7.4)	107 (18.8)	123 (21.7)	111 (19.5)	71 (12.5)	38 (6.7)	25 (4.4)	25 (4.4)	568 (100.0)	3,520	4,088	181.73	41.71
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
平均	136.49	140.96	141.02	142.42	142.21	140.87	140.67	140.04	143.90	136.85	141.28	140.06	141.01		
標準偏差	23.25	26.40	23.22	22.55	22.98	22.07	22.18	22.34	24.46	23.60	22.83	23.03	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査