

表 3708 HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	701 (0.4)	13,326 (8.4)	38,391 (24.2)	42,409 (26.7)	30,322 (19.1)	17,542 (11.1)	8,543 (5.4)	4,001 (2.5)	1,801 (1.1)	1,529 (1.0)	158,565 (100.0)	97,076	255,641	48.28	16.54
血液透析濾過 （％）	84 (0.3)	1,927 (6.4)	6,285 (21.0)	7,572 (25.3)	6,105 (20.4)	3,952 (13.2)	2,073 (6.9)	1,038 (3.5)	444 (1.5)	397 (1.3)	29,877 (100.0)	13,406	43,283	50.85	17.20
血液濾過 （％）			4 (57.1)	3 (42.9)							7 (100.0)	85	92	38.57	7.28
血液吸着透析 （％）	3 (0.3)	66 (5.8)	189 (16.7)	307 (27.2)	242 (21.4)	180 (15.9)	88 (7.8)	31 (2.7)	15 (1.3)	9 (0.8)	1,130 (100.0)	500	1,630	51.51	15.81
在宅血液透析 （％）		16 (5.4)	45 (15.2)	71 (23.9)	53 (17.8)	46 (15.5)	29 (9.8)	18 (6.1)	10 (3.4)	9 (3.0)	297 (100.0)	224	521	56.09	19.72
腹膜透析 （％）	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
合計 （％）	796 (0.4)	15,623 (8.1)	45,847 (23.6)	51,352 (26.5)	37,561 (19.4)	22,236 (11.5)	10,992 (5.7)	5,229 (2.7)	2,331 (1.2)	2,001 (1.0)	193,968 (100.0)	116,140	310,108	48.75	16.71
記載なし （％）															
総計 （％）	796 (0.4)	15,623 (8.1)	45,847 (23.6)	51,352 (26.5)	37,561 (19.4)	22,236 (11.5)	10,992 (5.7)	5,229 (2.7)	2,331 (1.2)	2,001 (1.0)	193,968 (100.0)	116,140	310,108	48.75	16.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査