

表 3718 HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		4 (12.9)	3 (9.7)	7 (22.6)	6 (19.4)	3 (9.7)	4 (12.9)	3 (9.7)		1 (3.2)	31 (100.0)	9	40	54.90	22.13
60～ (%)	6 (1.9)	30 (9.5)	66 (20.9)	82 (25.9)	57 (18.0)	36 (11.4)	16 (5.1)	17 (5.4)	3 (0.9)	3 (0.9)	316 (100.0)	117	433	48.88	19.90
80～ (%)	23 (0.9)	259 (10.3)	588 (23.4)	662 (26.4)	446 (17.8)	283 (11.3)	127 (5.1)	57 (2.3)	31 (1.2)	35 (1.4)	2,511 (100.0)	827	3,338	47.88	17.37
100～ (%)	101 (0.8)	1,168 (8.8)	3,241 (24.4)	3,540 (26.6)	2,513 (18.9)	1,386 (10.4)	748 (5.6)	334 (2.5)	156 (1.2)	122 (0.9)	13,309 (100.0)	4,298	17,607	47.98	16.63
120～ (%)	208 (0.5)	3,194 (7.8)	9,658 (23.5)	10,943 (26.7)	8,012 (19.5)	4,739 (11.5)	2,309 (5.6)	1,108 (2.7)	457 (1.1)	410 (1.0)	41,038 (100.0)	12,233	53,271	48.71	16.57
140～ (%)	218 (0.3)	4,887 (7.8)	14,537 (23.3)	16,462 (26.4)	12,214 (19.6)	7,320 (11.7)	3,654 (5.9)	1,742 (2.8)	769 (1.2)	638 (1.0)	62,441 (100.0)	18,381	80,822	49.03	16.71
160～ (%)	139 (0.3)	3,610 (8.0)	10,638 (23.7)	11,792 (26.3)	8,801 (19.6)	5,151 (11.5)	2,479 (5.5)	1,218 (2.7)	571 (1.3)	487 (1.1)	44,886 (100.0)	13,309	58,195	48.85	16.81
180～ (%)	56 (0.3)	1,531 (8.9)	4,177 (24.4)	4,586 (26.8)	3,160 (18.5)	1,871 (10.9)	951 (5.6)	407 (2.4)	206 (1.2)	170 (1.0)	17,115 (100.0)	5,109	22,224	48.17	16.60
200～ (%)	14 (0.3)	336 (7.9)	1,038 (24.3)	1,164 (27.2)	823 (19.3)	483 (11.3)	214 (5.0)	106 (2.5)	40 (0.9)	57 (1.3)	4,275 (100.0)	1,271	5,546	48.44	16.66
220～ (%)	2 (0.2)	81 (9.0)	226 (25.1)	242 (26.9)	151 (16.8)	98 (10.9)	49 (5.4)	28 (3.1)	14 (1.6)	10 (1.1)	901 (100.0)	259	1,160	48.53	17.39
合計 (%)	767 (0.4)	15,100 (8.1)	44,172 (23.6)	49,480 (26.5)	36,183 (19.4)	21,370 (11.4)	10,551 (5.6)	5,020 (2.7)	2,247 (1.2)	1,933 (1.0)	186,823 (100.0)	55,813	242,636	48.73	16.71
記載なし (%)	29 (0.4)	523 (7.3)	1,675 (23.4)	1,872 (26.2)	1,378 (19.3)	866 (12.1)	441 (6.2)	209 (2.9)	84 (1.2)	68 (1.0)	7,145 (100.0)	60,327	67,472	49.24	16.66
総計 (%)	796 (0.4)	15,623 (8.1)	45,847 (23.6)	51,352 (26.5)	37,561 (19.4)	22,236 (11.5)	10,992 (5.7)	5,229 (2.7)	2,331 (1.2)	2,001 (1.0)	193,968 (100.0)	116,140	310,108	48.75	16.71
平均	144.02	151.18	151.37	151.25	151.17	151.35	151.02	150.86	151.51	151.97	151.23	150.79	151.13		
標準偏差	26.33	24.87	24.38	24.23	23.83	23.77	23.80	23.71	23.49	24.74	24.16	24.45	24.23		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査