

表 3731 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	60	1,506	4,545	4,902	3,546	2,074	969	460	186	168	18,416	6,778	25,194	48.22	16.18
(%)	(0.3)	(8.2)	(24.7)	(26.6)	(19.3)	(11.3)	(5.3)	(2.5)	(1.0)	(0.9)	(100.0)				
女性	21	368	1,586	2,458	2,425	1,783	1,054	553	245	215	10,708	4,044	14,752	55.39	17.89
(%)	(0.2)	(3.4)	(14.8)	(23.0)	(22.6)	(16.7)	(9.8)	(5.2)	(2.3)	(2.0)	(100.0)				
合計	81	1,874	6,131	7,360	5,971	3,857	2,023	1,013	431	383	29,124	10,822	39,946	50.85	17.18
(%)	(0.3)	(6.4)	(21.1)	(25.3)	(20.5)	(13.2)	(6.9)	(3.5)	(1.5)	(1.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	81	1,874	6,131	7,360	5,971	3,857	2,023	1,013	431	383	29,124	10,822	39,946	50.85	17.18
(%)	(0.3)	(6.4)	(21.1)	(25.3)	(20.5)	(13.2)	(6.9)	(3.5)	(1.5)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査