

表 3741 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	6	228	668	669	500	294	125	65	29	21	2,605	3,137	5,742	47.94	16.36
(%)	(0.2)	(8.8)	(25.6)	(25.7)	(19.2)	(11.3)	(4.8)	(2.5)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
女性	2	60	265	321	339	222	134	76	32	36	1,487	1,712	3,199	54.92	19.09
(%)	(0.1)	(4.0)	(17.8)	(21.6)	(22.8)	(14.9)	(9.0)	(5.1)	(2.2)	(2.4)	(100.0)				
合計	8	288	933	990	839	516	259	141	61	57	4,092	4,849	8,941	50.47	17.72
(%)	(0.2)	(7.0)	(22.8)	(24.2)	(20.5)	(12.6)	(6.3)	(3.4)	(1.5)	(1.4)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	8	288	933	990	839	516	259	141	61	57	4,092	4,849	8,941	50.47	17.72
(%)	(0.2)	(7.0)	(22.8)	(24.2)	(20.5)	(12.6)	(6.3)	(3.4)	(1.5)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査