

表 3747 HDL-C濃度(mg/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

Non-HDL-C濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		1 (5.6)		4 (22.2)	3 (16.7)	6 (33.3)	1 (5.6)		1 (5.6)	2 (11.1)	18 (100.0)		18	66.67	32.73
50～ (%)		8 (7.0)	18 (15.8)	26 (22.8)	25 (21.9)	13 (11.4)	4 (3.5)	9 (7.9)	4 (3.5)	7 (6.1)	114 (100.0)		114	56.07	23.32
70～ (%)	2 (0.6)	20 (5.7)	66 (18.8)	67 (19.1)	68 (19.4)	54 (15.4)	31 (8.8)	17 (4.8)	11 (3.1)	15 (4.3)	351 (100.0)		351	55.76	21.78
90～ (%)		45 (6.8)	139 (21.1)	177 (26.8)	153 (23.2)	88 (13.3)	27 (4.1)	22 (3.3)	5 (0.8)	4 (0.6)	660 (100.0)		660	49.59	15.83
110～ (%)	2 (0.3)	46 (5.8)	177 (22.2)	201 (25.2)	176 (22.1)	105 (13.2)	52 (6.5)	18 (2.3)	12 (1.5)	8 (1.0)	797 (100.0)		797	50.35	16.31
130～ (%)	1 (0.2)	43 (6.5)	152 (23.0)	161 (24.3)	148 (22.4)	76 (11.5)	50 (7.6)	23 (3.5)	5 (0.8)	3 (0.5)	662 (100.0)		662	49.76	15.88
150～ (%)	1 (0.2)	38 (8.7)	115 (26.4)	101 (23.2)	77 (17.7)	53 (12.2)	27 (6.2)	13 (3.0)	4 (0.9)	7 (1.6)	436 (100.0)		436	48.79	17.44
170～ (%)		28 (10.6)	74 (28.1)	73 (27.8)	40 (15.2)	29 (11.0)	9 (3.4)	5 (1.9)	5 (1.9)		263 (100.0)		263	46.19	15.21
190～ (%)		15 (12.5)	31 (25.8)	23 (19.2)	24 (20.0)	7 (5.8)	14 (11.7)	4 (3.3)	2 (1.7)		120 (100.0)		120	49.17	17.68
210～ (%)	2 (2.2)	8 (8.9)	30 (33.3)	19 (21.1)	11 (12.2)	8 (8.9)	7 (7.8)	4 (4.4)		1 (1.1)	90 (100.0)		90	46.61	18.28
合計 (%)	8 (0.2)	252 (7.2)	802 (22.8)	852 (24.3)	725 (20.6)	439 (12.5)	222 (6.3)	115 (3.3)	49 (1.4)	47 (1.3)	3,511 (100.0)		3,511	50.26	17.50
記載なし (%)		36 (6.2)	131 (22.5)	138 (23.8)	114 (19.6)	77 (13.3)	37 (6.4)	26 (4.5)	12 (2.1)	10 (1.7)	581 (100.0)	4,849	5,430	51.74	18.95
総計 (%)	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
平均	149.63	134.95	134.28	128.85	125.29	122.88	129.99	123.21	116.98	103.02	128.47		128.47		
標準偏差	70.26	41.91	39.26	36.02	35.09	36.31	38.37	44.02	38.62	38.45	38.01		38.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査