

表 3748 HDL-C濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)		1	82.00	
60～ (%)		3 (25.0)		3 (25.0)	3 (25.0)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)			12 (100.0)	1	13	48.83	19.07
80～ (%)	2 (2.2)	15 (16.7)	19 (21.1)	19 (21.1)	17 (18.9)	9 (10.0)	4 (4.4)	2 (2.2)	2 (2.2)	1 (1.1)	90 (100.0)	34	124	46.56	18.24
100～ (%)	1 (0.2)	33 (7.5)	124 (28.1)	103 (23.3)	90 (20.4)	47 (10.6)	24 (5.4)	10 (2.3)	5 (1.1)	5 (1.1)	442 (100.0)	199	641	48.47	17.21
120～ (%)	2 (0.2)	65 (5.7)	264 (23.3)	263 (23.3)	228 (20.2)	144 (12.7)	83 (7.3)	43 (3.8)	17 (1.5)	22 (1.9)	1,131 (100.0)	385	1,516	51.44	18.37
140～ (%)	3 (0.2)	82 (6.8)	248 (20.5)	306 (25.3)	247 (20.4)	169 (14.0)	71 (5.9)	46 (3.8)	25 (2.1)	12 (1.0)	1,209 (100.0)	370	1,579	51.04	17.28
160～ (%)		44 (8.1)	120 (22.2)	133 (24.6)	114 (21.1)	65 (12.0)	34 (6.3)	15 (2.8)	8 (1.5)	7 (1.3)	540 (100.0)	181	721	49.90	17.64
180～ (%)		11 (6.8)	43 (26.5)	40 (24.7)	35 (21.6)	22 (13.6)	7 (4.3)	3 (1.9)		1 (0.6)	162 (100.0)	55	217	48.02	15.26
200～ (%)		3 (13.0)	3 (13.0)	6 (26.1)	6 (26.1)	1 (4.3)	3 (13.0)	1 (4.3)			23 (100.0)	8	31	50.04	17.04
220～ (%)		3 (42.9)		2 (28.6)		1 (14.3)	1 (14.3)				7 (100.0)	3	10	46.43	20.04
合計 (%)	8 (0.2)	259 (7.2)	821 (22.7)	875 (24.2)	740 (20.5)	459 (12.7)	228 (6.3)	122 (3.4)	57 (1.6)	48 (1.3)	3,617 (100.0)	1,236	4,853	50.42	17.66
記載なし (%)		29 (6.1)	112 (23.6)	115 (24.2)	99 (20.8)	57 (12.0)	31 (6.5)	19 (4.0)	4 (0.8)	9 (1.9)	475 (100.0)	3,613	4,088	50.86	18.22
総計 (%)	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
平均	125.38	140.93	140.69	142.36	141.90	141.98	141.06	140.07	140.30	137.81	141.45	139.73	141.01		
標準偏差	24.02	27.28	22.81	22.50	22.28	21.93	22.37	20.96	18.58	19.23	22.68	23.41	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査