

表 3749 HDL-C濃度(mg/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												1	1		
20～ (%)		2 (22.2)	3 (33.3)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)		1 (11.1)			9 (100.0)	6	15	44.22	18.74
40～ (%)	2 (0.7)	39 (14.3)	65 (23.9)	66 (24.3)	45 (16.5)	29 (10.7)	16 (5.9)	1 (0.4)	6 (2.2)	3 (1.1)	272 (100.0)	103	375	46.91	18.26
60～ (%)	3 (0.2)	106 (6.9)	385 (25.0)	378 (24.6)	299 (19.4)	181 (11.8)	95 (6.2)	53 (3.4)	18 (1.2)	21 (1.4)	1,539 (100.0)	526	2,065	49.73	17.27
80～ (%)	1 (0.1)	63 (6.5)	203 (20.8)	231 (23.7)	221 (22.7)	123 (12.6)	63 (6.5)	32 (3.3)	21 (2.2)	16 (1.6)	974 (100.0)	322	1,296	51.61	18.59
90～ (%)	1 (0.2)	31 (5.6)	110 (19.9)	134 (24.2)	122 (22.1)	78 (14.1)	33 (6.0)	28 (5.1)	9 (1.6)	7 (1.3)	553 (100.0)	161	714	51.87	17.08
100～ (%)	1 (0.4)	17 (6.9)	50 (20.3)	58 (23.6)	47 (19.1)	44 (17.9)	20 (8.1)	5 (2.0)	3 (1.2)	1 (0.4)	246 (100.0)	101	347	50.93	16.32
120～ (%)		1 (7.7)	4 (30.8)	4 (30.8)	2 (15.4)	2 (15.4)					13 (100.0)	5	18	43.92	11.94
140～ (%)			1 (100.0)								1 (100.0)		1	34.00	
合計 (%)	8 (0.2)	259 (7.2)	821 (22.8)	872 (24.2)	737 (20.4)	458 (12.7)	227 (6.3)	120 (3.3)	57 (1.6)	48 (1.3)	3,607 (100.0)	1,225	4,832	50.40	17.65
記載なし (%)		29 (6.0)	112 (23.1)	118 (24.3)	102 (21.0)	58 (12.0)	32 (6.6)	21 (4.3)	4 (0.8)	9 (1.9)	485 (100.0)	3,624	4,109	51.05	18.23
総計 (%)	8 (0.2)	288 (7.0)	933 (22.8)	990 (24.2)	839 (20.5)	516 (12.6)	259 (6.3)	141 (3.4)	61 (1.5)	57 (1.4)	4,092 (100.0)	4,849	8,941	50.47	17.72
平均	72.50	76.61	78.21	78.86	79.61	80.96	80.07	80.83	79.58	78.58	79.10	78.74	79.01		
標準偏差	20.35	15.52	14.29	14.13	13.77	14.73	13.77	12.71	13.70	12.49	14.23	15.02	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査