

表 3751 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	2,833 (2.0)	13,412 (9.6)	29,700 (21.2)	34,963 (25.0)	27,786 (19.8)	16,884 (12.1)	8,430 (6.0)	3,721 (2.7)	1,412 (1.0)	879 (0.6)	140,020 (100.0)	115,621	255,641	106.51	33.37
血液透析濾過 （％）	543 (2.1)	2,464 (9.5)	5,262 (20.2)	6,423 (24.7)	5,323 (20.5)	3,240 (12.5)	1,635 (6.3)	699 (2.7)	265 (1.0)	145 (0.6)	25,999 (100.0)	17,284	43,283	107.14	33.35
血液濾過 （％）				1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)	1 (14.3)		7 (100.0)	85	92	147.14	36.54
血液吸着透析 （％）	15 (1.4)	97 (9.1)	226 (21.3)	267 (25.2)	228 (21.5)	126 (11.9)	60 (5.7)	31 (2.9)	6 (0.6)	5 (0.5)	1,061 (100.0)	569	1,630	106.38	31.56
在宅血液透析 （％）	1 (0.4)	14 (5.2)	30 (11.1)	64 (23.6)	67 (24.7)	50 (18.5)	28 (10.3)	7 (2.6)	5 (1.8)	5 (1.8)	271 (100.0)	250	521	120.59	34.30
腹膜透析 （％）	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
合計 （％）	3,410 (2.0)	16,101 (9.4)	35,569 (20.8)	42,378 (24.8)	34,203 (20.0)	20,963 (12.3)	10,590 (6.2)	4,722 (2.8)	1,809 (1.1)	1,124 (0.7)	170,869 (100.0)	139,239	310,108	107.08	33.61
記載なし （％）															
総計 （％）	3,410 (2.0)	16,101 (9.4)	35,569 (20.8)	42,378 (24.8)	34,203 (20.0)	20,963 (12.3)	10,590 (6.2)	4,722 (2.8)	1,809 (1.1)	1,124 (0.7)	170,869 (100.0)	139,239	310,108	107.08	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査