

表 3754 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（透析患者全体）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,758	12,695	25,511	27,740	20,242	11,477	5,384	2,293	860	504	109,464	88,677	198,141	102.55	32.45
(%)	(2.5)	(11.6)	(23.3)	(25.3)	(18.5)	(10.5)	(4.9)	(2.1)	(0.8)	(0.5)	(100.0)				
女性	652	3,406	10,058	14,638	13,961	9,486	5,206	2,429	949	620	61,405	50,562	111,967	115.16	34.11
(%)	(1.1)	(5.5)	(16.4)	(23.8)	(22.7)	(15.4)	(8.5)	(4.0)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
合計	3,410	16,101	35,569	42,378	34,203	20,963	10,590	4,722	1,809	1,124	170,869	139,239	310,108	107.08	33.61
(%)	(2.0)	(9.4)	(20.8)	(24.8)	(20.0)	(12.3)	(6.2)	(2.8)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	3,410	16,101	35,569	42,378	34,203	20,963	10,590	4,722	1,809	1,124	170,869	139,239	310,108	107.08	33.61
(%)	(2.0)	(9.4)	(20.8)	(24.8)	(20.0)	(12.3)	(6.2)	(2.8)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査