

表 3763 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,202	10,193	20,461	22,042	15,846	8,866	4,103	1,755	636	376	86,480	60,553	147,033	102.01	32.18
(%)	(2.5)	(11.8)	(23.7)	(25.5)	(18.3)	(10.3)	(4.7)	(2.0)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
女性	514	2,713	8,071	11,537	10,833	7,267	3,940	1,812	702	456	47,845	34,093	81,938	114.44	33.83
(%)	(1.1)	(5.7)	(16.9)	(24.1)	(22.6)	(15.2)	(8.2)	(3.8)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
合計	2,716	12,906	28,532	33,579	26,679	16,133	8,043	3,567	1,338	832	134,325	94,646	228,971	106.43	33.32
(%)	(2.0)	(9.6)	(21.2)	(25.0)	(19.9)	(12.0)	(6.0)	(2.7)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	2,716	12,906	28,532	33,579	26,679	16,133	8,043	3,567	1,338	832	134,325	94,646	228,971	106.43	33.32
(%)	(2.0)	(9.6)	(21.2)	(25.0)	(19.9)	(12.0)	(6.0)	(2.7)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査