

表 3769 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前収縮期血圧	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)			8 (33.3)	6 (25.0)	4 (16.7)	4 (16.7)		1 (4.2)	1 (4.2)		24 (100.0)	11	35	111.33	31.39
60～ (%)	5 (2.9)	20 (11.8)	38 (22.4)	35 (20.6)	28 (16.5)	24 (14.1)	7 (4.1)	5 (2.9)	6 (3.5)	2 (1.2)	170 (100.0)	101	271	108.12	38.06
80～ (%)	45 (2.9)	190 (12.2)	342 (22.0)	358 (23.1)	266 (17.1)	189 (12.2)	82 (5.3)	52 (3.3)	17 (1.1)	12 (0.8)	1,553 (100.0)	824	2,377	104.61	35.79
100～ (%)	221 (2.6)	950 (11.0)	1,893 (22.0)	2,157 (25.0)	1,571 (18.2)	1,002 (11.6)	471 (5.5)	228 (2.6)	74 (0.9)	47 (0.5)	8,614 (100.0)	4,541	13,155	104.41	33.52
120～ (%)	589 (2.1)	2,667 (9.5)	5,969 (21.3)	7,109 (25.4)	5,557 (19.8)	3,376 (12.1)	1,649 (5.9)	688 (2.5)	236 (0.8)	172 (0.6)	28,012 (100.0)	13,564	41,576	105.99	32.94
140～ (%)	906 (2.1)	4,267 (9.8)	9,241 (21.2)	10,904 (25.0)	8,746 (20.1)	5,106 (11.7)	2,619 (6.0)	1,117 (2.6)	403 (0.9)	239 (0.5)	43,548 (100.0)	20,655	64,203	106.06	33.09
160～ (%)	608 (1.9)	2,992 (9.4)	6,795 (21.4)	7,977 (25.1)	6,263 (19.7)	3,841 (12.1)	1,941 (6.1)	845 (2.7)	350 (1.1)	201 (0.6)	31,813 (100.0)	15,030	46,843	106.73	33.36
180～ (%)	201 (1.6)	1,058 (8.6)	2,505 (20.4)	3,038 (24.7)	2,588 (21.0)	1,540 (12.5)	751 (6.1)	381 (3.1)	152 (1.2)	88 (0.7)	12,302 (100.0)	5,700	18,002	108.45	33.55
200～ (%)	62 (2.0)	279 (9.0)	629 (20.2)	720 (23.1)	604 (19.4)	426 (13.7)	221 (7.1)	96 (3.1)	46 (1.5)	32 (1.0)	3,115 (100.0)	1,400	4,515	109.51	35.66
220～ (%)	11 (1.7)	47 (7.4)	113 (17.8)	145 (22.8)	139 (21.9)	92 (14.5)	44 (6.9)	28 (4.4)	7 (1.1)	10 (1.6)	636 (100.0)	258	894	112.81	36.44
合計 (%)	2,648 (2.0)	12,470 (9.6)	27,533 (21.2)	32,449 (25.0)	25,766 (19.9)	15,600 (12.0)	7,785 (6.0)	3,441 (2.7)	1,292 (1.0)	803 (0.6)	129,787 (100.0)	62,084	191,871	106.43	33.33
記載なし (%)	68 (1.5)	436 (9.6)	999 (22.0)	1,130 (24.9)	913 (20.1)	533 (11.7)	258 (5.7)	126 (2.8)	46 (1.0)	29 (0.6)	4,538 (100.0)	32,562	37,100	106.59	32.81
総計 (%)	2,716 (2.0)	12,906 (9.6)	28,532 (21.2)	33,579 (25.0)	26,679 (19.9)	16,133 (12.0)	8,043 (6.0)	3,567 (2.7)	1,338 (1.0)	832 (0.6)	134,325 (100.0)	94,646	228,971	106.43	33.32
平均	149.45	150.70	151.49	151.74	152.45	152.41	152.86	153.06	154.74	154.60	151.91	151.08	151.64		
標準偏差	24.24	23.95	23.82	23.68	23.73	24.47	24.09	25.20	25.69	26.80	23.97	24.10	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査