

表 3772 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	427	1,901	3,709	4,022	2,984	1,693	791	306	116	65	16,014	9,180	25,194	102.20	32.25
(%)	(2.7)	(11.9)	(23.2)	(25.1)	(18.6)	(10.6)	(4.9)	(1.9)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
女性	102	502	1,429	2,243	2,178	1,456	806	376	146	76	9,314	5,438	14,752	115.58	33.58
(%)	(1.1)	(5.4)	(15.3)	(24.1)	(23.4)	(15.6)	(8.7)	(4.0)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
合計	529	2,403	5,138	6,265	5,162	3,149	1,597	682	262	141	25,328	14,618	39,946	107.12	33.37
(%)	(2.1)	(9.5)	(20.3)	(24.7)	(20.4)	(12.4)	(6.3)	(2.7)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	529	2,403	5,138	6,265	5,162	3,149	1,597	682	262	141	25,328	14,618	39,946	107.12	33.37
(%)	(2.1)	(9.5)	(20.3)	(24.7)	(20.4)	(12.4)	(6.3)	(2.7)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査