

表 3778 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		1 (100.0)									1 (100.0)	1	2	68.00	
60～ (%)	3 (4.6)	8 (12.3)	15 (23.1)	16 (24.6)	11 (16.9)	2 (3.1)	6 (9.2)	2 (3.1)	2 (3.1)		65 (100.0)	50	115	102.40	36.71
80～ (%)	10 (2.5)	47 (11.6)	98 (24.1)	90 (22.2)	79 (19.5)	49 (12.1)	16 (3.9)	10 (2.5)	4 (1.0)	3 (0.7)	406 (100.0)	209	615	103.84	33.84
100～ (%)	44 (2.2)	189 (9.6)	387 (19.7)	486 (24.7)	398 (20.3)	252 (12.8)	121 (6.2)	56 (2.8)	19 (1.0)	13 (0.7)	1,965 (100.0)	835	2,800	107.34	33.99
120～ (%)	114 (2.1)	522 (9.7)	1,106 (20.5)	1,357 (25.1)	1,034 (19.1)	666 (12.3)	347 (6.4)	164 (3.0)	58 (1.1)	33 (0.6)	5,401 (100.0)	2,238	7,639	107.17	33.83
140～ (%)	165 (2.1)	705 (8.9)	1,665 (21.0)	1,991 (25.1)	1,692 (21.3)	960 (12.1)	468 (5.9)	185 (2.3)	69 (0.9)	47 (0.6)	7,947 (100.0)	3,486	11,433	106.54	32.67
160～ (%)	124 (2.1)	586 (10.1)	1,170 (20.2)	1,395 (24.1)	1,171 (20.2)	755 (13.0)	343 (5.9)	157 (2.7)	63 (1.1)	31 (0.5)	5,795 (100.0)	2,513	8,308	106.89	33.39
180～ (%)	46 (2.1)	231 (10.6)	427 (19.5)	540 (24.7)	421 (19.3)	243 (11.1)	173 (7.9)	66 (3.0)	28 (1.3)	11 (0.5)	2,186 (100.0)	968	3,154	107.54	34.85
200～ (%)	6 (1.1)	39 (6.9)	108 (19.0)	131 (23.1)	128 (22.6)	77 (13.6)	48 (8.5)	21 (3.7)	8 (1.4)	1 (0.2)	567 (100.0)	255	822	111.87	33.03
220～ (%)	4 (3.1)	8 (6.2)	16 (12.4)	32 (24.8)	34 (26.4)	19 (14.7)	9 (7.0)	4 (3.1)	3 (2.3)		129 (100.0)	87	216	112.78	33.06
合計 (%)	516 (2.1)	2,336 (9.5)	4,992 (20.4)	6,038 (24.7)	4,968 (20.3)	3,023 (12.4)	1,531 (6.3)	665 (2.7)	254 (1.0)	139 (0.6)	24,462 (100.0)	10,642	35,104	107.02	33.46
記載なし (%)	13 (1.5)	67 (7.7)	146 (16.9)	227 (26.2)	194 (22.4)	126 (14.5)	66 (7.6)	17 (2.0)	8 (0.9)	2 (0.2)	866 (100.0)	3,976	4,842	110.04	30.77
総計 (%)	529 (2.1)	2,403 (9.5)	5,138 (20.3)	6,265 (24.7)	5,162 (20.4)	3,149 (12.4)	1,597 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,328 (100.0)	14,618	39,946	107.12	33.37
平均	149.23	150.42	150.02	150.36	151.01	150.76	151.92	151.17	152.05	147.67	150.58	150.87	150.67		
標準偏差	24.99	24.90	24.50	24.71	24.80	24.82	25.82	26.35	27.23	23.09	24.86	25.44	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査