

表 3779 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (25.0)	3 (75.0)				4 (100.0)	3	7	148.00	6.68
20～ (%)	1 (1.3)	5 (6.4)	14 (17.9)	27 (34.6)	17 (21.8)	9 (11.5)	4 (5.1)		1 (1.3)		78 (100.0)	43	121	104.62	27.19
40～ (%)	49 (2.7)	202 (11.2)	393 (21.7)	465 (25.7)	342 (18.9)	197 (10.9)	88 (4.9)	43 (2.4)	16 (0.9)	13 (0.7)	1,808 (100.0)	872	2,680	103.95	33.86
60～ (%)	232 (2.2)	1,037 (9.9)	2,230 (21.2)	2,591 (24.7)	2,096 (19.9)	1,252 (11.9)	632 (6.0)	286 (2.7)	96 (0.9)	56 (0.5)	10,508 (100.0)	4,464	14,972	106.09	33.26
80～ (%)	128 (2.1)	559 (9.0)	1,230 (19.8)	1,513 (24.4)	1,319 (21.2)	803 (12.9)	389 (6.3)	161 (2.6)	72 (1.2)	39 (0.6)	6,213 (100.0)	2,790	9,003	107.79	33.36
90～ (%)	73 (2.0)	338 (9.0)	744 (19.9)	912 (24.4)	765 (20.5)	491 (13.1)	245 (6.6)	110 (2.9)	41 (1.1)	20 (0.5)	3,739 (100.0)	1,578	5,317	108.16	33.59
100～ (%)	29 (1.5)	177 (9.4)	336 (17.9)	477 (25.4)	379 (20.2)	239 (12.7)	152 (8.1)	59 (3.1)	22 (1.2)	10 (0.5)	1,880 (100.0)	821	2,701	109.77	33.93
120～ (%)	2 (1.7)	7 (5.9)	24 (20.2)	25 (21.0)	23 (19.3)	16 (13.4)	11 (9.2)	5 (4.2)	6 (5.0)		119 (100.0)	50	169	114.84	36.41
140～ (%)			1 (14.3)	3 (42.9)		1 (14.3)	2 (28.6)				7 (100.0)	5	12	119.57	31.76
合計 (%)	514 (2.1)	2,325 (9.5)	4,972 (20.4)	6,013 (24.7)	4,941 (20.3)	3,009 (12.4)	1,526 (6.3)	664 (2.7)	254 (1.0)	138 (0.6)	24,356 (100.0)	10,626	34,982	107.02	33.46
記載なし (%)	15 (1.5)	78 (8.0)	166 (17.1)	252 (25.9)	221 (22.7)	140 (14.4)	71 (7.3)	18 (1.9)	8 (0.8)	3 (0.3)	972 (100.0)	3,992	4,964	109.71	30.94
総計 (%)	529 (2.1)	2,403 (9.5)	5,138 (20.3)	6,265 (24.7)	5,162 (20.4)	3,149 (12.4)	1,597 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,328 (100.0)	14,618	39,946	107.12	33.37
平均	77.59	78.38	78.52	79.03	79.57	79.87	80.54	80.05	81.32	78.93	79.19	79.12	79.17		
標準偏差	14.39	14.65	14.48	14.74	14.31	14.71	15.34	14.43	15.74	14.04	14.63	14.87	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査