

表 3781 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	10	92	267	472	518	397	246	128	63	35	2,228	3,514	5,742	123.41	36.03
(%)	(0.4)	(4.1)	(12.0)	(21.2)	(23.2)	(17.8)	(11.0)	(5.7)	(2.8)	(1.6)	(100.0)				
女性	8	22	84	188	279	265	190	135	57	55	1,283	1,916	3,199	137.25	39.75
(%)	(0.6)	(1.7)	(6.5)	(14.7)	(21.7)	(20.7)	(14.8)	(10.5)	(4.4)	(4.3)	(100.0)				
合計	18	114	351	660	797	662	436	263	120	90	3,511	5,430	8,941	128.47	38.01
(%)	(0.5)	(3.2)	(10.0)	(18.8)	(22.7)	(18.9)	(12.4)	(7.5)	(3.4)	(2.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	18	114	351	660	797	662	436	263	120	90	3,511	5,430	8,941	128.47	38.01
(%)	(0.5)	(3.2)	(10.0)	(18.8)	(22.7)	(18.9)	(12.4)	(7.5)	(3.4)	(2.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査