

表 3782 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (10.0)		1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)		1 (10.0)	2 (20.0)	10 (100.0)	87	97	167.50	56.23
15歳～ (%)			4 (14.8)	6 (22.2)	7 (25.9)	6 (22.2)	3 (11.1)	1 (3.7)			27 (100.0)	84	111	117.07	26.49
30歳～ (%)	1 (0.3)	9 (3.0)	29 (9.7)	54 (18.1)	64 (21.5)	59 (19.8)	40 (13.4)	21 (7.0)	11 (3.7)	10 (3.4)	298 (100.0)	403	701	130.15	38.88
45歳～ (%)	8 (0.8)	37 (3.9)	97 (10.2)	177 (18.6)	189 (19.9)	189 (19.9)	116 (12.2)	82 (8.6)	30 (3.2)	27 (2.8)	952 (100.0)	1,350	2,302	128.70	39.23
60歳～ (%)	7 (0.4)	53 (3.4)	161 (10.3)	291 (18.6)	391 (25.0)	278 (17.7)	186 (11.9)	117 (7.5)	50 (3.2)	33 (2.1)	1,567 (100.0)	2,467	4,034	127.33	37.21
75歳～ (%)	2 (0.3)	14 (2.3)	56 (9.1)	125 (20.3)	138 (22.4)	120 (19.5)	80 (13.0)	38 (6.2)	26 (4.2)	16 (2.6)	615 (100.0)	976	1,591	129.44	37.43
90歳～ (%)		1 (2.4)	3 (7.1)	7 (16.7)	7 (16.7)	8 (19.0)	8 (19.0)	4 (9.5)	2 (4.8)	2 (4.8)	42 (100.0)	63	105	137.71	37.76
合計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
平均	59.94	62.29	62.21	62.96	63.20	62.60	62.59	62.06	63.53	60.21	62.67	62.31	62.45		
標準偏差	12.61	11.55	13.21	13.22	12.87	13.65	14.06	12.62	14.37	15.85	13.34	15.25	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査