

表 3783 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	6 (0.5)	47 (3.6)	139 (10.5)	232 (17.6)	287 (21.7)	243 (18.4)	171 (12.9)	94 (7.1)	59 (4.5)	43 (3.3)	1,321 (100.0)	2,279	3,600	129.96	39.35
2年～ (%)	7 (0.6)	31 (2.5)	109 (8.9)	244 (19.9)	283 (23.0)	238 (19.4)	159 (12.9)	94 (7.6)	37 (3.0)	27 (2.2)	1,229 (100.0)	1,972	3,201	128.73	37.10
5年～ (%)	5 (0.7)	28 (3.9)	77 (10.6)	134 (18.5)	179 (24.7)	141 (19.4)	78 (10.7)	52 (7.2)	15 (2.1)	17 (2.3)	726 (100.0)	931	1,657	125.39	36.56
10年～ (%)		3 (1.9)	14 (8.9)	38 (24.1)	36 (22.8)	26 (16.5)	20 (12.7)	16 (10.1)	4 (2.5)	1 (0.6)	158 (100.0)	182	340	127.67	33.72
15年～ (%)		4 (7.7)	9 (17.3)	8 (15.4)	11 (21.2)	8 (15.4)	3 (5.8)	5 (9.6)	3 (5.8)	1 (1.9)	52 (100.0)	45	97	123.23	43.89
20年～ (%)			1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	2 (25.0)			1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)	12	20	155.25	81.47
25年～ (%)			1 (12.5)	1 (12.5)		2 (25.0)	4 (50.0)				8 (100.0)		8	134.25	33.78
30年～ (%)		1 (14.3)	1 (14.3)			2 (28.6)	1 (14.3)	2 (28.6)			7 (100.0)	3	10	134.86	48.42
35年～ (%)				1 (50.0)					1 (50.0)		2 (100.0)	1	3	145.00	67.88
40年～ (%)															
合計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,425	8,936	128.47	38.01
不明 (%)												5	5		
記載なし (%)															
総計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
平均	3.33	3.72	3.46	3.53	3.36	3.43	3.26	3.63	3.04	2.76	3.41	2.90	3.10		
標準偏差	2.77	4.59	4.16	3.87	3.41	3.95	4.04	4.27	5.08	3.74	3.93	3.29	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査