

表 3785 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別(腹膜透析患者)

医療機関	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	4	14	58	79	62	37	27	11	11	304	409	713	134.40	38.41
(%)	(0.3)	(1.3)	(4.6)	(19.1)	(26.0)	(20.4)	(12.2)	(8.9)	(3.6)	(3.6)	(100.0)				
私立大学	2	7	37	54	77	82	60	32	19	8	378	755	1,133	134.07	38.30
(%)	(0.5)	(1.9)	(9.8)	(14.3)	(20.4)	(21.7)	(15.9)	(8.5)	(5.0)	(2.1)	(100.0)				
国立		1	7	12	10	11	9	3	3	1	57	145	202	128.56	35.50
(%)		(1.8)	(12.3)	(21.1)	(17.5)	(19.3)	(15.8)	(5.3)	(5.3)	(1.8)	(100.0)				
県市町村立	5	18	61	113	125	70	62	31	15	13	513	1,073	1,586	123.68	38.13
(%)	(1.0)	(3.5)	(11.9)	(22.0)	(24.4)	(13.6)	(12.1)	(6.0)	(2.9)	(2.5)	(100.0)				
社会保険		4	19	19	16	24	17	15	2	4	120	367	487	130.80	38.60
(%)		(3.3)	(15.8)	(15.8)	(13.3)	(20.0)	(14.2)	(12.5)	(1.7)	(3.3)	(100.0)				
厚生連		10	37	60	67	65	35	22	15	5	316	310	626	126.98	36.24
(%)		(3.2)	(11.7)	(19.0)	(21.2)	(20.6)	(11.1)	(7.0)	(4.7)	(1.6)	(100.0)				
その他公的	5	23	60	106	129	117	66	43	22	12	583	736	1,319	127.39	38.39
(%)	(0.9)	(3.9)	(10.3)	(18.2)	(22.1)	(20.1)	(11.3)	(7.4)	(3.8)	(2.1)	(100.0)				
私立総合		8	13	32	41	19	27	14	5	6	165	212	377	130.47	38.94
(%)		(4.8)	(7.9)	(19.4)	(24.8)	(11.5)	(16.4)	(8.5)	(3.0)	(3.6)	(100.0)				
私立	1	29	62	115	143	121	73	46	19	20	629	1,060	1,689	128.25	39.31
(%)	(0.2)	(4.6)	(9.9)	(18.3)	(22.7)	(19.2)	(11.6)	(7.3)	(3.0)	(3.2)	(100.0)				
私立診療所	4	10	41	91	110	91	50	30	9	10	446	363	809	126.59	35.17
(%)	(0.9)	(2.2)	(9.2)	(20.4)	(24.7)	(20.4)	(11.2)	(6.7)	(2.0)	(2.2)	(100.0)				
総計	18	114	351	660	797	662	436	263	120	90	3,511	5,430	8,941	128.47	38.01
(%)	(0.5)	(3.2)	(10.0)	(18.8)	(22.7)	(18.9)	(12.4)	(7.5)	(3.4)	(2.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査