

表 3788 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

| 拡張期血圧       | 50未満        | 50～          | 70～           | 90～           | 110～          | 130～          | 150～          | 170～         | 190～         | 210～        | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均     | 標準偏差  |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 20未満<br>(%) |             |              |               |               |               |               |               |              |              |             |                  | 1     | 1     |        |       |
| 20～<br>(%)  |             |              | 1<br>(11.1)   | 2<br>(22.2)   | 2<br>(22.2)   |               | 1<br>(11.1)   | 1<br>(11.1)  |              | 2<br>(22.2) | 9<br>(100.0)     | 6     | 15    | 152.22 | 67.51 |
| 40～<br>(%)  | 3<br>(1.3)  | 7<br>(3.0)   | 28<br>(11.9)  | 48<br>(20.3)  | 41<br>(17.4)  | 47<br>(19.9)  | 28<br>(11.9)  | 20<br>(8.5)  | 10<br>(4.2)  | 4<br>(1.7)  | 236<br>(100.0)   | 139   | 375   | 127.49 | 38.41 |
| 60～<br>(%)  | 8<br>(0.6)  | 49<br>(3.7)  | 136<br>(10.1) | 252<br>(18.8) | 334<br>(24.9) | 244<br>(18.2) | 146<br>(10.9) | 95<br>(7.1)  | 36<br>(2.7)  | 41<br>(3.1) | 1,341<br>(100.0) | 724   | 2,065 | 127.16 | 38.85 |
| 80～<br>(%)  | 2<br>(0.2)  | 25<br>(2.9)  | 87<br>(10.2)  | 160<br>(18.7) | 186<br>(21.7) | 172<br>(20.1) | 117<br>(13.7) | 68<br>(7.9)  | 28<br>(3.3)  | 11<br>(1.3) | 856<br>(100.0)   | 440   | 1,296 | 128.06 | 34.59 |
| 90～<br>(%)  | 2<br>(0.4)  | 12<br>(2.6)  | 47<br>(10.2)  | 95<br>(20.6)  | 94<br>(20.4)  | 86<br>(18.7)  | 63<br>(13.7)  | 34<br>(7.4)  | 15<br>(3.3)  | 13<br>(2.8) | 461<br>(100.0)   | 253   | 714   | 128.86 | 38.78 |
| 100～<br>(%) | 2<br>(1.0)  | 6<br>(2.9)   | 21<br>(10.0)  | 34<br>(16.3)  | 41<br>(19.6)  | 39<br>(18.7)  | 33<br>(15.8)  | 18<br>(8.6)  | 10<br>(4.8)  | 5<br>(2.4)  | 209<br>(100.0)   | 138   | 347   | 131.84 | 38.43 |
| 120～<br>(%) |             |              | 1<br>(7.7)    | 5<br>(38.5)   | 3<br>(23.1)   |               | 1<br>(7.7)    | 2<br>(15.4)  | 1<br>(7.7)   |             | 13<br>(100.0)    | 5     | 18    | 129.00 | 36.56 |
| 140～<br>(%) |             |              |               |               |               |               |               |              |              |             |                  | 1     | 1     |        |       |
| 合計<br>(%)   | 17<br>(0.5) | 99<br>(3.2)  | 321<br>(10.3) | 596<br>(19.1) | 701<br>(22.4) | 588<br>(18.8) | 389<br>(12.4) | 238<br>(7.6) | 100<br>(3.2) | 76<br>(2.4) | 3,125<br>(100.0) | 1,707 | 4,832 | 128.08 | 37.76 |
| 記載なし<br>(%) | 1<br>(0.3)  | 15<br>(3.9)  | 30<br>(7.8)   | 64<br>(16.6)  | 96<br>(24.9)  | 74<br>(19.2)  | 47<br>(12.2)  | 25<br>(6.5)  | 20<br>(5.2)  | 14<br>(3.6) | 386<br>(100.0)   | 3,723 | 4,109 | 131.65 | 39.92 |
| 総計<br>(%)   | 18<br>(0.5) | 114<br>(3.2) | 351<br>(10.0) | 660<br>(18.8) | 797<br>(22.7) | 662<br>(18.9) | 436<br>(12.4) | 263<br>(7.5) | 120<br>(3.4) | 90<br>(2.6) | 3,511<br>(100.0) | 5,430 | 8,941 | 128.47 | 38.01 |
| 平均          | 75.41       | 77.12        | 78.21         | 78.99         | 78.72         | 79.19         | 80.20         | 79.08        | 80.01        | 77.07       | 78.95            | 79.12 | 79.01 |        |       |
| 標準偏差        | 18.17       | 13.64        | 14.76         | 14.54         | 13.63         | 13.37         | 14.42         | 15.23        | 15.07        | 15.61       | 14.22            | 14.81 | 14.43 |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査