

表 3789 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 脈拍(拍/分)別(腹膜透析患者)

脈拍	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				1 (33.3)		2 (66.7)					3 (100.0)	2	5	124.00	18.73
40～ (%)		2 (11.8)	4 (23.5)	3 (17.6)	3 (17.6)	2 (11.8)	3 (17.6)				17 (100.0)	8	25	109.12	32.68
50～ (%)	1 (0.8)	3 (2.5)	12 (10.0)	28 (23.3)	33 (27.5)	21 (17.5)	9 (7.5)	9 (7.5)	2 (1.7)	2 (1.7)	120 (100.0)	67	187	123.22	33.80
60～ (%)	4 (0.7)	21 (3.7)	78 (13.9)	113 (20.1)	112 (20.0)	103 (18.4)	63 (11.2)	38 (6.8)	16 (2.9)	13 (2.3)	561 (100.0)	289	850	124.68	39.12
70～ (%)	5 (0.6)	29 (3.3)	83 (9.4)	188 (21.3)	218 (24.7)	151 (17.1)	96 (10.9)	67 (7.6)	27 (3.1)	19 (2.2)	883 (100.0)	388	1,271	126.70	37.96
80～ (%)	5 (0.7)	21 (3.1)	67 (9.8)	119 (17.4)	152 (22.2)	139 (20.3)	96 (14.0)	53 (7.7)	18 (2.6)	14 (2.0)	684 (100.0)	340	1,024	128.57	36.38
90～ (%)	2 (0.6)	9 (2.8)	32 (10.0)	53 (16.5)	70 (21.8)	67 (20.9)	46 (14.3)	22 (6.9)	10 (3.1)	10 (3.1)	321 (100.0)	160	481	129.98	37.97
100～ (%)		5 (3.8)	7 (5.3)	29 (22.0)	25 (18.9)	25 (18.9)	16 (12.1)	9 (6.8)	9 (6.8)	7 (5.3)	132 (100.0)	72	204	134.61	40.51
110～ (%)			4 (13.3)	6 (20.0)	3 (10.0)	4 (13.3)	3 (10.0)	3 (10.0)	5 (16.7)	2 (6.7)	30 (100.0)	22	52	144.50	48.28
120～ (%)			2 (28.6)		2 (28.6)	1 (14.3)	2 (28.6)				7 (100.0)	13	20	116.00	33.57
合計 (%)	17 (0.6)	90 (3.3)	289 (10.5)	540 (19.6)	618 (22.4)	515 (18.7)	334 (12.1)	201 (7.3)	87 (3.2)	67 (2.4)	2,758 (100.0)	1,361	4,119	127.42	37.94
記載なし (%)	1 (0.1)	24 (3.2)	62 (8.2)	120 (15.9)	179 (23.8)	147 (19.5)	102 (13.5)	62 (8.2)	33 (4.4)	23 (3.1)	753 (100.0)	4,069	4,822	132.33	38.06
総計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
平均	75.29	76.36	76.54	77.27	77.43	78.06	79.52	77.90	81.71	80.25	77.87	78.53	78.09		
標準偏差	12.02	12.62	12.93	12.88	12.41	13.10	13.12	11.96	15.48	13.83	12.92	13.94	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査